朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍昌林縣公臣王璆等奉

從高墮下方三首

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

墜損方三首

墜落車馬方六首

折骨方三首

傷筋方三首

筋骨俱傷方七首

折跧方一首

折跧瘀血方四首

蹉跌方三首

被打有瘀血方一十三首

靜嘉堂文庫所藏

被打損青腫方七首
許仁則療吐血及墮損方三首
金瘡禁忌序一首
金瘡預備膏散方三首
金瘡方一十一首
金瘡續筋骨方三首
金瘡止痛方五首
金瘡生肌方四首
金瘡去血多虛竭內補方二首
金瘡中風方八首
諸瘡中風寒水露方五首
被刀箭傷方一十一首
竹木刺不出方一十六首

狐尿刺方二首
狐刺方四首
惡刺方三首
灸瘡方四首
灸瘡膿不差方三首
火燒瘡及火油天火瘡方三首
火灼爛壞方五首
湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首
湯火瘡無問大小方四首
湯火爛瘡方五首
湯煎膏火所燒方四首
漆瘡方二十七首
侵淫瘡方七首

靜嘉堂文庫所藏

月蝕瘡方一十二首
代指方一十一首
甲疽方五首
肉刺方二首
手足皸裂方五首
手足逆臚及瘃壞方二首
疣目方一十九首
去黑子方二首
疣贅瘢黑子雜療方六首
滅瘢痕方一十七首
從高墮下方三首
千金療丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷絶崩中皆主之方

阿膠炙 乾薑各二兩 艾葉 芍藥各三兩

右四味切以水八升煮取三升去滓入膠令消分二服羸人三服女人產後崩中傷下血過多虛喘腹中絞痛下血不止服之悉愈

又療從高墮下瀉血及女人崩中方

當歸二分 大黃一分

右二味擣爲散酒服方寸匕日三范汪同並出第二十六卷中

千金翼膠艾湯主男子傷絶或從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡經內絶者方

阿膠炙 艾葉 芍藥 乾地黃各三兩 乾薑 當歸 甘草炙 芎藭各二兩

右八味切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服羸人三服此湯正主婦人產後崩中傷下血多虛喘欲死腹痛下血

靜嘉堂文庫所藏

不止者服之良忌海藻菘菜蕪荑出第十九卷中
從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首
療濟療從高墮下內損瘀血消血散方
蒲黃十分　當歸　乾薑　桂心各八分
蟲蟲四分去足翅熬　大黃十三分
右六味擣爲散空腹以酒服方寸匕日再漸漸加至一匕半
忌生葱猪犬肉出第四卷中
肘後療卒從高墮下瘀血悵心面青短氣欲死方
取胡粉一錢匕以水服之備急文仲同
又方
煮大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之彌佳千金
備急文仲同一云大豆二升煮令熟取汁二升去豆以淳酒六七升和飲之一日飲盡小豆亦佳
又方
生乾地黃二兩熬末以酒服之
又方
生地黃擣取汁服一升或二升尤佳
又方
烏鷄翅羽二七枚燒末酒和服之即當吐血也如得左羽尤佳
又療從高墮下若爲重物所頓笮得瘀血方
豆豉三升沸湯二升漬之食頃絞去滓內蒲黃三合投中攪調頓服之不過三四服神良刪繁小品文仲備急集驗千金同
又方
烏梅五升去核以飴糖五升煮稍稍食之自消文仲備急千金同

靜嘉堂文庫所藏

又方

取茅連根葉擣絞取汁一二升服之不過三四服愈

冬用根

又方

刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕日四五服良

又方

末鹿角酒服三方寸匕日三千金同

又方

取敗蒲薦燒灰以酒服方寸匕並出第三卷中

深師療從高墮下傷內血在腹聚不出療下血方

取好大黃二兩 桃人三十枚去尖皮兩人者

右二味擣以水五升煮取三升分爲三服去血後作地黃酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下之虛極殺人也

又療墮落瘀血桃枝湯方

桃枝一握中指長到 芒消五分 大黃四兩 當歸

甘草炙 桂心各三兩 蜚蟲二十枚去翅足

桃人五十枚去尖皮熬 水蛭二十枚熬

右九味咬咀以水八升煮取三升去滓溫分三服內消芒令海藻菘菜生葱等

又療墮落積瘀血消血理中膏方

大黃二兩 猪脂二斤 桂心一兩 乾薑一兩

當歸二兩 通草 亂髮各兩

右七味切以膏煎髮令消盡擣藥下篩須令絶細下膏更地內諸藥攪勻微火煎之三上三下即藥成去滓以好酒服一兩日二服一方不去滓是生子膏亦佳並出第二十六卷中

千金療從高墮下及被木石所迮或因落馬凡是傷損血疾凝滯

靜嘉堂文庫所藏

氣急欲絕無不療方

淨土五升蒸之令極熱分半以故布數重裹之熨病上勿令大熱恐破肉候冷即易之以痛止即已但有損傷並以此法療之神効已死不能言者亦活三十年亦差

又療從高墮下損有瘀血方

瞿麥八兩 附子一枚炮去皮末

右二味為散以酒服五六錢匕日三不知增之並出第二十六卷中

近効土質汗療折傷內損有瘀血毋天陰則疼痛兼療產婦產後諸疾神効方 開寶本草云質汗主金瘡傷折瘀血內損瘀血下血婦人產後諸血並酒消服之亦傳熱血成之今以益母成煎故謂之土質汗也

三月採益母草一重搥一名夏枯草

右一味揀擇去諸雜草及乾葉以新水淨洗於箔上攤曬令水盡則用手援斷可長五寸以來勿用刀切即置鐺中量水兩石以來令草水深三二寸則縱火煎候益母草糜爛水又減耗三分減二分以上則濾去草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日以下以綿濾取清汁盆中淳澱並盡弃之其清汁於小盆中慢火煎取一斗以來如稀餳每取梨許大煖酒和服之日再服和羹粥喫並得如遠行不能將稀煎去即更鍊令稠硬停作小丸服之七日內則疼痛漸瘳二七日平復或有產婦惡露不盡及血運一兩服即差其藥兼療風益心力無所忌

鄭長史處吏部李郎中服之得力

墜損方三首

廣濟療墜損骨肉苦疼痛不可忍方

故馬轡兩段其轡欲得故膩者於鍋中以酒五六升煮一抄鹽煮令熱即內轡於鍋中看轡熱便用裹所損

靜嘉堂文庫所藏

處冷即易之勿令久熱傷肉如是三五遍痛定即止仍服止痛藥散即漸差

又療男子虛勞墜傷內損吐血不止欲死面目黑如漆者悉主之方

黃耆　芎藭　當歸　芍藥　各三兩　甘草三兩炙　生薑八兩

右六味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服服別相去六七里不利忌生冷海藻菘菜猪魚並出第四卷中

近効療墜損方

生地黃一斤分爲三分

右每服取一分熬令焦黃以酒半升煎一兩沸絞去滓令溫煖得所食前日三無所忌馬墜亦療之

墜落車馬方六首

肘後療忽落馬墻墜車及墜屋坻岸腕傷身體頭面四肢內外切痛煩躁叫喚不得卧方

急覓鼠矢無問多少燒擣末以猪膏和塗封痛處急裹之仍取好大黃如雞子大以亂髮裹上如鴨子大以人所裁白越布衫領巾間餘布以裹髮外乃令火燒煙斷擣末屑薄以酒服日再三無越布餘布可強用常當預備此物爲要備急集驗古今錄驗同出第三卷中

千金療凡人墜落車馬心腹積血嘔吐血無數方

乾藕根末酒服方寸匕日三如無取新者擣取汁服之尤妙禁口味物

又療墮馬及樹崩血瘀血腹滿短氣方

大豆五升水一斗煮得二升半去豆頓服劇者不過

靜嘉堂文庫所藏

三服並出第二十六卷中

千金翼療落馬墮車及諸傷腕折臂脚疼痛不止方

黃耆　芍藥各三兩　乾地黃　當歸

附子炮　通草　續斷　桂心

乾薑各二兩　蜀椒一合汗　烏頭半兩炮

右十一味擣爲散先食酒服五分匕日三忌猪肉冷水生葱

蕪荑出第十九卷中本方有大黃一兩又云服方寸匕

救急療墜馬落車被打傷腕折臂呼喚痛聲不絕服此散呼嘯之間不復大痛三日筋骨相連當歸散方

當歸熬令香　桂心　甘草炙　蜀椒汗各二分

菩薤六分熬　附子炮　澤蘭熬各一分

右七味擣爲散酒服方寸匕日三小兒被奔車馬所損裂其膝皮肉未見骨即絕死小蘇啼不可聽聞服之便眠十數日便行走其神驗如此忌海藻菘菜生葱猪肉冷水千金翼深師同出第六卷中

近效療墮馬內損方

取塭藥一小兩擣爲末牛乳一盞煎五六沸和服李諫議云塭藥以羊肉汁和服一日內不用菜極効出第一卷中塭藥見陳藏器本草

折骨方三首

肘後療凡脫折折骨諸瘡腫者愼不可當風卧濕及多自扇若中風則發痙口噤殺人若已中此覺頸項強身中急束者急服此方

竹瀝飲三二升若口已噤者可以物拗開內之令下禁冷飲食及飲酒竹瀝卒燒難得多可合束十許枚併燒中央兩頭承其汁投之可活小品備急文仲古今錄驗同出第三卷中

靜嘉堂文庫所藏

千金療腕折骨痛不可忍方

取大麻根葉無問多少擣取汁飲一小升無生青者以乾者煮取汁服亦主墮墜打撲瘀血心腹脹滿短氣良出第二十六卷中

救急療骨折接令如故不限人畜也方

取鉆鐫（上柯魯切下毋朗切溫器也）銅錯取末仍擣以綿篩和少酒服之亦可食物和服之不過兩方寸匕以來任意斟酌之出第九卷中

傷筋方三首

千金療被傷筋絕方

取蟹頭中腦及足中髓熬之內瘡中筋即續生

又方

擣葛根汁飲之葛白屑熬令黃傅瘡止血並出第二

救急續斷筋方

取旋復草根淨洗去土擣量瘡大小取多少薄之日一易之以差爲度必効同出第九卷中

筋骨俱傷方七首

肘後療腕折四肢骨破碎及筋傷蹉跌方

爛擣生地黃熬之以裹折傷處以竹簡編夾裹之令遍病上急縛勿令轉動一日可十度易三日即差千金刪繁備急文仲古今録驗同

又方

取生括樓根擣之以塗損上以重布裹之熱除痛止備急同

又方

靜嘉堂文庫所藏

擣大豆末合猪膏和塗之乾即易之並出第三卷中

深師療折跌傷筋骨槐子膏方

槐子中人　秦艽　白朮　續斷　各一兩

桂心六分　巴豆十枚去皮心熬　大附子一枚炮

右七味㕮咀以醇苦酒漬槐子等一宿以成鍊猪脂二斤於微火上煎三上三下候膏成絞去滓温温酒服杏子許一枚日三并塗傅忌生葱猪肉冷水蘆筍桃李雀肉等出第二十卷中

千金療四肢骨碎及傷筋蹉跌方

生地黄多少熟擣熬以裹傷骨處頻易古今録驗同

又方

豉三升以水七升漬之絞去滓取汁飲止煩悶古今録驗同

又方

乾地黄　當歸　獨活　苦參　各三兩

右四味擣末以酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

折跪方一首

深師卓氏膏療折跌腕蹲方

大附子四枚生用去皮

右一味切以鍊成猪脂一斤以三年苦酒漬之三宿以脂膏煎之三上三下膏成欲傅膏時以木匕摩之亦療卒中風口噤頸項強出第二十六卷中

折跪瘀血方四首

千金療折跪瘀血方

蜚蟲去足翅熬　牡丹等分

右二味爲散以酒服方寸匕血化成水

又方

靜嘉堂文庫所藏

大黃六兩 桂心二兩 桃人六十枚去皮

右三味切以酒六升煮取三升分三服當下血羞並出第二十六卷中

千金眞療折跪瘀血方

菴蕳草汁飲之亦可作散服出第十九卷中

古今錄驗療折跪瘀血方

蒲黃一升 當歸二兩

右二味擣散酒服方寸匕日三先食服之千金同出第二十四卷中

蹉跌方三首

深師療蹉跌補絕復傷地黃散方

乾地黃十分 桂心 乾薑 芎藭

甘草炙 當歸各三分 芍藥五分

右七味擣爲散先食以酒服方寸匕日三服忌海藻菘菜生葱蕪荑

又方

大豆熬令黑 大黃各二兩 桂心一兩

右三味擣爲散分爲三劑酒和服忌生葱又大黃一兩生地黃三兩切熬以水酒二升煮取一升頓服之差出第二十六卷中

范注蹉跌膏兼療金瘡方

當歸 續斷 附子去皮 細辛

甘草炙 通草 芎藭 白芷

牛膝各二兩 蜀椒二合

右十味㕮咀以猪膏二斤煎以白芷色黃膏成絞去滓日再以摩損處忌生菜猪肉冷水海藻菘菜等出第十卷中

靜嘉堂文庫所藏

被打有瘀血方一十三首

肘後療著爲人所打舉身盡有瘀血方

刮青竹皮二升　亂髮如雞子大四枚燒灰　延胡索二兩

右三味擣散以一合酒一升煎三沸頓服日三四備急范汪同

又療被打擊有瘀血在腹內久不消時時發動方

大黃二兩　乾地黃四兩

右二味擣散爲丸以酒服三十丸日再爲散服亦妙備急

文仲小品范汪等同並出第三卷中

范汪療被打有瘀血方

大黃二兩　桃人去尖皮熬　蚵蟲各二十一枚去足翅熬

右三味擣蜜丸四丸即內於酒一升中煎取七合一服之備急

肘後同

又方

薑葉切一升　當歸三兩

右二味爲末以酒服方寸匕日三並出第十卷中

備急若久血不除變成膿者宜此方

大黃三兩　桃人三十枚去尖兩人碎

右二味切以水五升煮取三升分三服當下膿血不盡更作文

仲肘後同

又若久宿血在諸骨節及脅肋外不去者方

牡丹　蚵蟲去足熬等分

右二味擣末以酒服方寸匕血化成水忌胡荽小品文仲千

金并翼古今錄驗同

又方

大黃如雞子一枚　蚯蚓矢一合

右二味酒半升煮取三沸服之

又方

鐵一斤酒三升煮取一升服之又燒令赤投酒服之小品

文仲肘後同出第八卷中

千金療被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃一升　當歸　桂心各二兩

右三味擣散以酒服方寸匕日三夜一不能酒飲服之忌生葱劉消子方

又方

擣苴苕子末以傅瘡上

又夫有瘀血者其人憙忘不欲聞人聲胷中氣塞短氣方

甘草一兩炙　茯苓二兩　杏人五合去皮尖碎

右三味切以水一斗煮取三升分爲三服忌海藻菘菜酢物

范汪同

又被歐擊損傷聚血腹滿方

敗一升以水二升煮三沸去滓再服不差重服之范汪同出第二十六卷中

張文仲劉消子療被打腹中瘀血白馬蹄散方

白馬蹄燒令煙斷擣末以酒服方寸匕日三夜一三亦療婦人瘀血消化爲水肘後備急千金同

被打損青腫方七首

千金療被打頭眼青腫方

用新熱羊肉傅之

又方

大豆黃末和傅之

又方

牆上朽骨唾於石上研摩之乾易

靜嘉堂文庫所藏

又方
釜月下土細末塗之
又方
羊皮上卧之
又方
炙肥猪肉令熱揭上又炙猪肝貼之亦佳出第二十六卷中
文仲療被打青腫方
以水磨桂塗之赤則以牆中朽骨磨塗之則平復也
梁都督侍中傳效也出第八卷中
許仁則療吐血及墮損方三首
許仁則論曰此病有兩種一者緣墮打損內傷而致此病一者緣積熱兼勞而有此病若內傷自須依前墜內損大便血等諸

方救之若積熱累勞吐血狀更無餘候但覺心中悄悄似欲吐背上煩熱便致此病宜依後雞蘇七味湯桑白皮八味散療之方
雞蘇 五兩 生地黃 切 青竹筎 各一升 生薑
桑白皮 各六兩 小薊根 切六合 生葛根 切六合
右藥切以水九升煮取三升去滓分温三服服別相去如人行十里久若一劑得力欲重合服至四五劑尤佳隔三四日服一劑如未定則宜合後桑白皮八味散服之
桑白皮散方
桑根白皮 六兩 生薑屑 六兩 柏葉 雞蘇 各四兩
小薊根 五兩 乾地黃 七兩 青竹筎 一升 薤著 地松 三兩
右藥擣散煮桑白皮飲和一方寸匕日再服漸漸加至二三匕以竹瀝下亦得
又此病有兩種一者外損內傷自宜依內陽外損因墜打壓損

靜嘉堂文庫所藏

或手足肢節肱頭項傷折骨節痛不可忍覺內損者須依前內損法服湯藥如不內損只傷肢節宜依後生地黃一味薄之法及芥子蘇等摩之方

生地黃無問多少淨洗擣碎令爛熬之候水氣盡及熱以薄折處冷即易之如骨蹉跌即依療折傷法縛兼薄羊腦生龜生鼠等法爲有所損此不復載如傷損處輕擣芥子和蘇以摩傷處若被打墜壓傷損急卒雖不至昏悶腹內無覺觸然身之中相去非遠外雖無狀內宜通利或慮損傷氣不散外雖備用諸方腹內亦須資藥但不勞大湯如前內損欲死者服湯取利欲用時間小小諸物服之理應無嫌其法略出如後小便酒煮生地黃每始王木綏木梓葉匱藥梔藥猪脂及石蜜白石地菘延胡索赤泥藥

以上十一物並出下卷吳昇同

金瘡禁忌序一首

肘後凡金瘡去血其人若渴然每忍之常勿乾食并肥脂之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥輩則血溢出殺人不可救也又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞勿多食酸鹹飲酒熱羹臛輩皆使瘡痛腫發甚者即死瘡差後猶爾出百日半年乃稍復常耳凡金瘡傷天窻眉角腦戶臂裏跳脉髀內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六腑輸此皆是死處不可療也又破腦出血而不能言語戴眼直視咽中沸聲口急唾出兩手妄舉亦皆死候不可療若腦出而無諸候者可療又舉卒無汁者中風也瘡邊自出黃汁者中水也並欲作痙候可急療之又痛不在瘡處者傷經也亦死之非又血出不可止前赤後黑或白肌肉腐臭寒冷堅急者其瘡難愈亦死也並出第三卷中

金瘡預備膏散方三首

肘後療金瘡膏散三種宜預備合以防急疾一要續斷膏方

蜀續斷　蛇銜　防風　各三兩

右三味切以猪脂三斤於東向竈竈煎之三下三上膏成去滓若深大瘡者但傅四邊未可使合若淺小瘡者但通傅便相連令止血住痛亦可以酒服如杏子大

又治葛蛇銜膏方

蛇銜　薔薇根　續斷　治葛　各二兩　當歸　附子各一兩半去皮　防風　黃芩　澤蘭各一兩　松脂　柏脂各三兩

右十一味㕮咀以猪脂二斤煎之別以白芷一枚內中候色黃即膏成去滓濾以密器收貯之以塗瘡無問大小皆差不生膿汁也出第七卷中

深師預備金瘡散方

乾薑　甘草炙　桂心　各一兩　當歸三兩　芎藭四兩　蜀椒三兩汗

右六味擣散以酒服方寸匕日三忌海藻菘菜生葱肘後同出第二十九卷中

金瘡方一十一首

肘後療金瘡方

割韃方一寸燒灰研以傅之差

又方

杏人去皮尖擣如泥石灰分等以猪脂和之滿足合煎令杏人黃絞去滓以塗瘡上日五六過愈

又方

燒故青布作灰傅瘡上裹縛之數日差可解去

靜嘉堂文庫所藏

又方
以蛇衙草擣傅之差

又方
狼牙草莖葉熟擣傅貼之兼止血一方搗草接傅之

又方
五月五日採葛根暴乾擣末傅瘡上止血止痛

又方
鈎樟根出江南刮取屑傅瘡上有神驗

又方
紫檀末以傅金瘡止痛止血生肌

又方
燒牡蠣末傅之佳凡裹縛瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好並出第七卷中

近効金瘡或壓損斷裂方
剥取新桑皮作線縫之又以新桑皮裹之以桑白汁塗之極驗小瘡但以桑皮裹即差

又金瘡灸瘡火燒瘡等方
膩(加胡桃人)杏子(一抄一枚)擣(半合)槚(椰人)薰陸香
右四味和擣以猪脂煎即以此藥塗帛上貼瘡此方甚効
金瘡續筋骨方三首

千金療金瘡粉散辟風水續筋骨止血方
石灰 地菘苗 細辛 旋復根
葛葉 猪膏 青葙 麥門冬苗
益母苗(不限多少切)
右九味擣取汁和石灰作餅子暴乾末如粉以傅傷瘡上止血止痛生肌五月五日合之神効出第二十六卷中

靜嘉堂文庫所藏

必効療被斫筋斷者續筋方

旋復根擣汁瀝瘡中仍用滓封瘡上即封裹之十五日即斷筋便續矣更不須開易此方出蘇景仲家獠奴用効出第四卷中

古今録驗療金瘡中筋骨續斷散方

續斷 五兩　乾地黃　蛇銜　地榆

杜蘅 各四兩　乾薑　蜀椒 汗細辛

桂心 各一兩　當歸　芎藭　蔥蓉

芍藥 各三兩　人參　甘草 炙　附子 炮去皮各二兩

右十六味擣爲散以酒飲和服方寸匕日三服忌海藻菘菜生菜生葱猪肉冷水出第三十四卷中 一方無杜蘅有杜蠣

金瘡止痛方五首

范汪療金瘡內塞止痛地榆散方

地榆根　白斂 各二分　附子 一分炮　當歸 四分

芎藭　白芷　芍藥 各三分

右七味擣散以酒飲服方寸匕日三服忌猪肉冷水

又金瘡內塞逐痛方

黃芩　當歸 各三兩　甘草 炙二兩　細辛 三

烏頭 炮各二兩　乾薑 四兩　白芷 四兩

右七味擣篩以酒飲服一錢匕日三可至二錢匕忌生菜海藻菘菜猪肉冷水等

又金瘡止痛方

馬蹄燒灸三指撮以酒和服之並出第十九卷中

千金又金瘡若刺瘡痛不可忍者方

葱白一把水三升煮數沸漬洗瘡上痛即止異深師同出第二十六卷中 亦治風水入疼痛

靜嘉堂文庫所藏

古今錄驗療金瘡上痛壯蠣散方

牡蠣二分熬　石膏一分

右二味下篩以粉瘡痛即止出第三十四卷中

金瘡生肌方四首

廣濟療金瘡生肌破血補勞消瘡輕身紫葛湯方

紫葛三握細剉之以順流河水三大升煎取一升二合去滓空腹分三服若冷以酒一大升水二升和煮取一大升不利無忌出第六卷中

范汪療金瘡內塞止痛生肌肉散方

當歸甘草炙　肉蔻蓉　芎藭

芍藥蜀椒汗　吳茱萸　乾薑

桂心　白及　黃耆　厚朴炙

人參

右十三味等分擣爲散以酒飲服一方寸匕日三服忌海藻菘菜生葱等

又療金瘡生肌白膏方

白芷一兩六銖　乾地黃一兩半　芎藭一兩六銖　甘草半兩炙

當歸　白斂　附子各十八銖去皮　蜀椒二合半汗

右八味㕮咀以猪脂五斤合煎三上三下藥成去滓塗瘡上日再忌海藻菘菜猪肉冷水蕪荑並出第九十五卷中

古今錄驗療金瘡生肌散方

甘草一斤炙　黃蘗八兩　當歸四兩

右三味擣末以封瘡上日再出第三十四卷中

金瘡去血多虛竭內補方二首

千金療金瘡去血多虛竭內補方

當歸三兩　芍藥細辛各五分　乾薑三分

甘草 二分炙

右五味爲散以酒服方寸匕日三夜一忌海藻菘菜生菜出第二十六卷中

古今錄驗療金瘡去血多虛竭內補方

蜀椒 三分汗去目并合口者　乾薑 二分　蔾蓉

甘草 炙　芍藥　當歸　芎藭

桂心　黃芩　人參　黃耆

厚朴 炙　吳茱萸　桑白皮 各一兩

右十四味擣散以酒服方寸匕日三千金翼同出第三十四卷中 一方有白及無桑白皮

金瘡中風方八首

肘後療金瘡中風方

蜀椒量瘡大小用麪作餌餡飴塘灰中炮令熟及熱開一小口當瘡上掩之即引風出可多作取差備急小品同出第三卷中

必効療金瘡中風角弓反張者方

取杏人碎之蒸令餾擣絞取脂服一小升許兼以摩瘡上即差

又方

取蒜一大升破去心以無灰酒四升煮蒜令極爛并滓服一大升以來須臾汗如雨出則差

又療口噤不能語方

蔓菁子淨洗一升擣令細粘手撮爲炷以炙瘡上一兩度熱徹即差兼服後方

又療因瘡著風方

雞糞一合烏豆二升簸令淨二味相和於鐺中熬令

靜嘉堂文庫所藏

焦黑及熱瀉出以酒二大升淋之與服隨多少令盡
取汗差如無汗更作服

又療因瘡著風角弓反張方

取莨菪根可瘡大小截令平如無大者並縛數根稱
瘡以爲限猪脂一大合鹽末一雞子黃大和膏於火
上温之令膏鹽相得不用過熱熱即傷肉以煖得灶
瘡上冷即易之爲兩灶於埳器中燒之更相用以差止驗

又方

生雞子烏麻油二味合煎稍稠待冷以封瘡上

古今録驗療金瘡得風身體痓強口噤不能語或因破打而得
及斧刀所傷得風臨死摠用此方無有不差瓠蠡燒麻燭熏之方

取未開瓠蠡一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡
相當可繞四邊閉塞勿使通氣上復開一孔如盌口取
浮麻子燭兩條並然瓠蠡向上燭盡更續之不過半
日即差若不止亦可經一兩日熏之以差爲度若燭
長不得内入瓠蠡可中折用之出第三十四卷中

諸瘡中風寒水露方五首

文仲云凡以八九月刺手足金瘡及諸瘡中寒露水令毒皆殺
人不可輕也療之方

生竹若桑枝兩條課得一物鑿著火中爲推引之令
極熱斫斷之正以頭灶瘡口中熱氣盡更易一枚盡
此二枚則瘡當爛乃取薤白擣以綿裹著熱灰中使
極熱去綿以薤白薄瘡上布帛急裹之肘後千金同

又療若已中水及惡露風寒腫痛方

以鹽數合急抑著瘡上以火炙之令熱達瘡中畢以
臘内竹管插熱灰中令烊以滴入瘡中即便愈若無

靜嘉堂文庫所藏

鹽用薤白但單用臘亦良肘後同出第五卷中

備急療諸瘡中風寒水露腫痛云因瘡而腫者皆中水及中風寒所作也其腫氣入腹則殺人也方

燒黍穰或牛馬乾糞棄條輩多煙之物掘地作坎於中燒之以版摙坎上穿版作小孔以瘡口當孔上熏之令瘡汁出盡乃止又滴熱臘瘡中佳集驗肘後文仲同

又方

以桑灰汁温之以漬瘡大良姚云神驗肘後千金同出第十八卷中

近効療瘡因水入疼痛方

取生葱一束擣以脚踏上須臾更著之華李諫議房給事録試効

被刀箭傷方一十一首

劉涓子療金瘡箭在肉中不出方

半夏三兩洗　白斂三兩

右二味下篩以酒服方寸匕日三淺者十日出深者二十日出終不住肉中肘後千金文仲小品同出第三卷中

肘後療卒被毒箭方

擣藍青絞取汁飲之并薄瘡上若無藍取青布漬之絞取汁飲之亦以汁淋灌瘡中肘後范汪文仲備急千金同

又方

黄藕取汁飲之多多益善肘後文仲備急同

又方

但多食生葛根自愈食無限不能或擣生葛絞取汁飲之乾者煮取飲之小品千金集驗備急文仲同

又方

乾薑鹽等分搗末傅瘡上毒皆自出范汪肘後備急
同一作葛
又凡毒箭有三種交廣夷俚用焦銅作鏃次嶺北用諸蛇蟲毒蠆
物汁著管中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射猪
犬雖困猶得活以其噉人糞故也人若有中之便即食糞或絞
濾取汁飲之并以塗瘡上須臾即定不爾不可救也又一種是
今之獵師射麞鹿用射罔以塗箭鏃人中之當時亦困頓著寬
處者不死若近脅腹亦宜急療之今葛氏方是射罔者耳
又療箭鏑及諸刃刀在咽喉脅腸隱處不出者方
牡丹一分　白斂二分
右二味擣末以温酒服方寸匕日三服刃自出肘後備急千金
同出第九卷中
小品療被毒箭傷方

雄黄末傅之當歸汁出即愈肘後千金集驗同此方亦療蛇毒
又方
食麻子數升愈擣飲其汁亦佳肘後范汪千金同出
第十卷中
集驗療毒箭方
以鹽滿瘡中灸鹽上三十壯肘後同
又方
煮蘆根汁飲一二升范汪小品同一云煮薑汁飲二三升
又療刀箭瘡有血不止方
以小兒矢塗封之三日即差並不傷人出第九卷中
竹木刺不出方
劉涓子竹木刺不出方
鹿角燒灰末以水和塗之立出久者不過一夕集驗方

靜嘉堂文庫所藏

仲備急肘後范汪古今録驗深師同出第三卷中

肘後療竹木刺不出方

取羊糞燥者燒灰和脂塗之刺著未出重傅之乃不覺刺出刪繁集驗千金備急深師同一云用乾羊糞未

又方

腎白梅塗之集驗千金同

又方

王不留行末服之并傅上即出集驗文仲深師千金同

又方

擣烏梅水和塗之刺上立出並出第三卷中千金用白梅

深師療刺不出方

以鹿腦厚傅上燥復易之半日即出出第二十九卷中

集驗療刺在肉中不出方

用牛膝根莖合擣以傅之即出縱瘡合其刺猶自出肘後備急文仲范汪深師千金同出第九卷中

千金療刺在人肉中不出方

煮瞿麥汁飲之日三立出

又方

温小便漬之

又方

白茅根燒末以膏和塗之亦主諸瘡因風致腫肘後同

又方

蕾微燒灰以水服方寸匕日二度十日刺出

又方

燒鑿枘爲灰酒服二方寸匕

又方

酸棗核燒末服之差

又方

頭垢塗之並出第二十六卷中

文仲療竹木刺不出方

刮象牙屑水和塗刺上立出肘後范汪備急深師同出第八卷中

救急療竹木刺傷方

嚼豉封之立差千金肘後同出第九卷中

狐尿刺方二首

千金翼論凡諸螳蜋之類盛暑之時多有孕育遊諸物上必有精汁其汁乾久則有毒人手觸之不疑之間則成其疾故曰狐尿刺日夜燋痛不識眠睡百方療不能差方

但取僕翁莢莖葉根斷之取白汁塗令厚一分即差神驗不傳出第二十四卷中

肘後療狐尿刺人腫痛欲死方

以熱桑柴灰汁漬之冷復易永差備急崔氏同出第八卷中

狐刺方四首

崔氏療狐刺方

取好豉心以足為限但覺被刺即熟嚼豉以薄之少須看豉中當見毛不見又速嚼豉數薄之以盡連夜勿絕但以毛盡便愈

又方

熟擣杏人細研煮一兩沸承熱以浸刺處數數易之大良古今録驗同

集驗療狐刺方

靜嘉堂文庫所藏

熱魚汁灌瘡中

備急療狐刺方

以熱臛灌瘡中又煙熏之令汁出愈此狐所溺之木猶如蛇螫也肘後小品文仲同出第八卷中

必効主狐刺痛如烏叫者方

生括樓香豉二味等分擣之爲餅傳患處乾即易之効段家方出第六卷中

惡刺方三首

千金翼療惡刺方

五月蔓菁子擣末和烏牛乳封之無烏牛但是牛乳亦得出第二十四卷中 本方云乏乳亦得

古今録驗療惡刺方

取未煮餅油脂以麪和油調須臾著瘡上即愈一云蔓菁根和粉以麪和油

又方

取麴末和獨頭蒜擣之搦如帽簪頭許內瘡孔中蟲出即差出第三十五卷中

灸瘡方四首

肘後論曰凡灸不依明堂脉穴或是惡日神惡時殺病人年神人神所犯天地昏暗日月無光久積陰沈及灸日食毒物方畢或灸觸犯房室等其灸瘡洪腫發作瘡痛病人加甚本灸者疾不痊增其火毒日夜楚痛遇其凡愚取次亂灸此皆因火毒傷藏即死矣今用方療之

柏白皮三兩 當歸一兩 薤白一升

右三味切以猪脂一升煎三上三下以薤白黃絞去滓以塗瘡上亦療風水中瘡火瘡出第三卷中

靜嘉堂文庫所藏

集驗療炙瘡痛腫急方

擣竈中黃土末之以水和煮令熱以漬之深師千金肘後同

又療炙瘡薤白膏生肌肉止痛方

薤白 當歸 各二兩 白芷一兩 羊髓一斤

右四味㕮咀以羊髓煎煞白芷色黃藥成去滓以傅瘡上日三肘後千金文仲同出第八卷中

千金療炙瘡方

甘草炙 當歸 各一兩 胡粉六分一作胡麻 羊脂六分

右四味切以猪脂五合煎之去滓以傅瘡上忌海藻菘菜出第二十六卷中

炙瘡膿不差方三首

肘後療炙瘡膿不差方

白蜜一兩 烏賊骨一兩末

右二味相和以塗之千金同

千金療炙瘡膿壞不差方

臘月猪脂一斤 薤白一切一外 胡粉一兩

右三味先煎薤白令黃去之綿裹石灰一兩更煎去之入胡粉令調傅之日三

又方

石灰一兩末細絹篩以猪脂和相得微火上煎數沸先以煖湯洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼瘡上炙之又擣薤傅之肘後同出第二十六卷中

火燒瘡及火油天火瘡方三首

集驗凡被火燒者初慎勿以冷水冷物并井下泥火瘡得冷即熱氣更深轉入至骨爛壞人筋攣縮者良由此也

靜嘉堂文庫所藏

又療卒被火燒苦劇悶絕不識人方

取新熱小便飲一升及冷水和蜜飲之口噤不開者可抌開灌之其悶差然後療外乃善千金古今錄驗

崔氏小品同出第八卷中

千金療火瘡方

末熬麻油和梔子人末塗之唯厚爲佳已成瘡者

飾白塘灰粉之即差出第二十六卷中

近効療火油及天火瘡初出似沸子漸漸大如水泡似火燒瘡赤色熱翕翕痛更侵淫漸多急速者是也方

芸薹菜不限多少擣絞取汁苎消大黃生鐵衣各等分擣大黃末相和苎消等以芸薹汁調如稀糊以禿筆點藥傳瘡上乾即再點頻用極有効閻師云芸薹冬月煮取汁洗亦可

火灼爛壞方五首

劉消子療火燒人肉爛壞麻子膏方

麻子一合取人碎　柏白皮　山梔子碎　白苎

甘草各一兩　柳白皮一兩

右六味㕮咀以猪脂一升煎三上三下去滓以塗瘡上日三出第五卷中

集驗療火爛瘡膏方

柏白皮　生地黃研各四兩　苦竹葉　甘草各四兩

右四味切以猪脂一斤煎三上三下藥成濾去滓以摩瘡上日再摩深師千金劉消子范汪同出第八卷中千金無地黃

千金墮火灼爛瘡方

榆白皮熟嚼封之差

又火瘡敗壞方

靜嘉堂文庫所藏

柏白皮切臘月猪膏合淹相和煮四五沸色變去滓塗瘡范汪同出第二十六卷中

又方

柏白皮　生地黃　黃芩　蛇衔
梔子　苦竹葉　各一兩

右六味切以羊髓半升煎之三上三下去滓塗封瘡上差止湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

肘後療湯火所灼未成瘡者方

取熯灰以水和習習爾以傅之亦以灰汁洗之

又方

黍米　女麴　分等

右二味各異熬令黑如炭擣下以雞子白和塗之良

又方

取菰蔣根洗去土燒灰雞子黃和塗之

又方

取柏白皮細切以猪膏煎以塗之以柏白皮彌佳

凡此以上三方皆能止痛疾仍不成瘡也

又方

以小便漬洗之

又方

以苦酒和雄黃塗之

又若已成瘡者方

以白蜜塗瘡上取竹幕貼之日三出第七卷中

范汪療湯火灼瘡方

破雞子取白塗之肘後同

又方

以豆醬汁塗之肘後文仲同並出第九十一卷中

備急療湯火灼瘡方

靜嘉堂文庫所藏

柳皮燒灰如粉傅之肘後同

又方

猪膏和米粉塗之日五六過良肘後同此二方既令不痛又使速愈又無瘢痕已試有効出第八卷中

湯火瘡無問大小方四首

崔氏療湯火瘡無問大小祕要方

取狗毛碎剪烊膠和之以遍封瘡上一封之後比至痂落亦不痛救急同出第五卷中

文仲療湯火瘡無問大小祕要方

新熱牛糞塗之良崔氏同出第十七卷中

救急療湯火瘡無問大小祕要方

取粟熬令焦黑投水中攪之良久濾取汁重煎如糖以傅瘡上并滅瘢崔氏同

又方

取黍米煮粥和雞子白傅瘡良並出第五卷中

湯火爛瘡方五首

肘後療湯火爛瘡方

取石膏擣末以傅之立愈古今録驗同出第三卷中

備急湯火灼爛方

白斂末塗之立有効

又方

以竹中蠹蚰末塗之良

又方

石灰末粉以水和塗之乾即易之並出第八卷中

古今録驗療湯火爛方

取商陸根擣末以粉瘡上出第四十卷中

湯煎膏火所燒方四首

肘後療為沸湯煎膏所燒火爛瘡方

靜嘉堂文庫所藏

丹參細切以羊脂煎成膏傅瘡上千金備急文仲集驗同

又方

熟擣生胡麻如泥以厚塗瘡上並出第七卷中

集驗被湯火熱膏所燒不問大小拖子膏方

拖子（三十枚） 白蜜 黃芩（各五兩）

右三味切以水五升麻油一升合煎令水氣竭去滓冷之以淋瘡令溜去火熱毒肌乃得宁也作二日任用膏塗湯散治之千金并翼古今録驗小品同出第八卷中

文仲洗湯煎膏所灼火焰所燒方

牛糞新者和以雞子白塗之比常用之亦不作瘡不痛神驗出第七卷中

漆瘡方二十七首

廣濟療漆瘡方

煮椒湯洗頻三五度又嚼糯米傅上乾即易之頻四五度即差忌熱麪肉飲酒出第五卷中

肘後療卒得漆瘡方

以雞子黃塗之乾即易之不過三五度文仲同

又方

煮栁葉湯適寒温洗之老栁皮尤妙集驗必効文仲千金同

又方

取生蠏黃塗之

又方

煮香薷以漬洗之深師古今録驗同

又方

濃煮鼠查莖葉洗之亦可擣取汁以塗之集驗千金同（赤狐也）

又方　嚼秫米以塗之

又方　以造酒小麴擣末以粉之乾即以雞子白和塗之良

又方　援慎火草若雞腸草以塗之柒姑草亦佳深師千金翼同

又方　以羊乳汁塗之千金翼深師同

又呪漆法畏漆人見漆便漆著之　唾之曰漆齊丹陽漆無弟無兄漆自死丹士二七須　鼠傷三唾之又呪三過止則不復生瘡也出第四卷中

刪繁療漆瘡方　取蓮葉乾者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再　肘後崔氏文仲千金同

又方　芒消五兩湯浸洗之肘後千金翼深師同出第九卷中

千金療著漆洗湯方　取磨石下滓泥塗之取差止大驗翼同

又方　礬石著湯中令消以洗之翼肘後同出第二十六卷中

千金翼療漆瘡方　貫衆擣末以塗之良乾以油和塗之集驗文仲肘後同

又方　取猪膏塗之文仲刪繁千金同

又方　宜噉肥肉集驗深師千金同

又方　嚼檫穀塗之出第十九卷中

崔氏療漆瘡方　頻以鹽湯洗之大良

靜嘉堂文庫所藏

又方　以馬尿洗之差止

備急療漆瘡方

擣韭根如泥塗之煮薤葉洗之隹肘後深師崔氏同

又方

取蟹擣以塗之最妙或以水浸之取水數數洗之亦効

救急療漆瘡方

以鐵漿洗之隨手差頻爲之妙出第八卷中

必効療漆瘡方

取七孫草擣汁二分和苦消一分塗之若無苦消即朴消最妙灸韭熨之効

又方

濃煮杉木汁洗之數數用即除小兒尤隹出第四卷中

古今録驗療漆瘡方

黄櫨木一斤剉鹽一合二味以水一斗煮取五升去滓候冷以洗之即差王長華家神方出第四十三卷中

論曰此疾雖小有著者遍身頭面似癩癩浮腫虫瘡痛痒毛髮脫落心煩恍惚不得眠睡因療之遲遂爲他疾或便成風癩亦可畏也

侵淫瘡方七首

肘後療卒得侵淫瘡轉廣有汁多起於心不早療之繞身周匝則能殺人方

以雞冠血塗之良

又方

取牛糞新者絞取汁以塗之亦燒煙熏之

又方　胡蘐爲窠末以水和塗之文仲備急同

又方

取鯽魚長三寸者以少豉合擣塗之亦療馬鞍瘡若先起四肢漸向頭面者難療也又取鯽魚油煎去魚塗之文仲備急同出第四卷中

集驗療卒毒氣攻身或腫或赤痛或痒并分散上下周匝煩毒欲死方

取生鯽魚切之如鱠以鹽和擣薄之若通身即多作遍病上乾復易之此爲侵淫瘡也備急同出第八卷中

古今録驗療侵淫瘡苦瓠散方

苦瓠一兩　蛇皮半兩燒　露蜂房半兩熬　大豆半升

梁上塵一合

右五味爲散以粉粥和塗紙貼赤處日三甚良

又療侵淫瘡戎鹽散方

戎鹽二分　大黃四分　茼茹一分

右三味擣散以酒和傅瘡上日三良

月蝕瘡方一十二首

廣濟療月蝕瘡方

自死青蛙一枚燒作灰　母猪蹄一枚燒灰　甘草末

救月杖燒灰

右四味等分蜜和塗瘡上日二差止

又方

五月五日乾蝦蟇一枚燒灰　石跡黃一兩研　礬石一兩熬令汁盡

右三味爲散以傅瘡上日二差止並出第五卷中小兒耳後瘡同用

肘後療大人小兒卒得月蝕瘡方

五月五日蝦蟇灰以猪膏和塗之差止文仲備急集驗同

又方

靜嘉堂文庫所藏

於月望夕取兔矢仍內蝦蟇腹中合燒爲灰末以傅瘡上差止集驗崔氏同 崔氏云兔矢七枚

又方 取蘼蕪摩草擣末塗之差

又方 燒蚯蚓矢令赤末以猪膏和傅之文仲備急千金古今録驗同

又云此瘡多在兩耳上及七孔邊隨月死生故名月蝕瘡也世言小兒夜指月所爲實多著小兒也文仲備急同

又方

水銀 黃連 末各二兩 胡粉 熬 松脂 各一兩研

右四味相和合研水銀消以粉瘡瘡如乾以臘月猪脂和先以鹽湯洗拭然後傅之出第十六卷中

集驗療月蝕瘡方

救月蝕皷皮如手許大一片以苦酒三升漬一宿以塗瘡上或云燒作灰脂和傅之崔氏同

又方 虎頭骨 二兩碎 浮萍 肩一兩

右二味以猪脂一斤煎取骨黃成膏以塗瘡上崔氏同

又方

菜萸根 地榆根 薔薇根

右三味各等分爲散作湯洗瘡取藥粉瘡上日三崔氏同

又方

然燭照瘡使燭熱氣相及瘡即愈崔氏古今録驗同並出第九卷中

千金翼療月蝕瘡惡肉方

斑猫 去足翅 石硫黃 蕙茹 各一兩末

右三味擣篩以粉瘡上如瘡乾以猪脂和塗之日三出第三

靜嘉堂文庫所藏

代指方一十一首

小品代指者其狀先腫痲痲熱痛色不黯黤然後緣瓜甲邊結膿劇者爪皆脫落亦謂之代指病也

又代指無毒正由人筋骨中熱感撮結故耳吳人名遭指野夫名爲土盧即皆是代指疾也療方

單煮甘草汁漬之或用荳消湯漬之搗青菜汁搦之但得一種浸搦之即差千金同

肘後療代指方

以猪膏和白善傳之數易差止深師千金翼同白善一作曲蠖土

又方

以指刺炊上熱飯中七過文仲集驗深師千金范汪同

又方

取梅核中人熟擣以淳苦酒和傅之須臾差止文仲同

又指忽掣痛不可忍方

灸指頭痛處七壯愈千金同

又指端忽發瘡方

燒鐵令熱勿令赤以灼之上三方俱主代指並出第五卷中

千金翼療代指方

先刺去膿炙鮓皮令熱以裹縛指令周匝痛即止便愈千金同出第二十三卷中

崔氏論代指者是五藏之氣使然流注於十二源經脉熱衝手指不還即代指也

當取熱湯急漬之即出使滿七度便以冷水中浸之訖又復浸之如此三度即塗羊膽愈未成膿此方甚効或

靜嘉堂文庫所藏

以猪膽盛代指纏之差出第四卷中本方云漬蓝封椎未便急

備急療手指忽腫痛不已者名爲代指方

和泥泥指令遍周匝厚一寸許以差熱灰中炮之令燥視皮皺即愈不皺者更爲之良久仲深師范汪同

又方

取粟米粉鐵鐺中熬令赤以衆人唾和之塗上令厚一寸即消

又方

小便和鹽作泥厚裹之數易差鑱針刺血出最妙出第五卷中

甲疽方五首

崔氏夫甲疽之爲病或因割甲傷肌或因甲長侵肉成瘡腫痛復緣靴窄研損四邊腫燉黃水出侵淫相染五指俱爛漸漸引上脚趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍增萬醫所不能療之方

綠礬石五兩形色似朴消而綠色

右一味置於鐵版上聚炭封之以囊袋吹令火熾即沸流出色赤如融金看沸定汁盡去火待冷收取授爲末色似黃丹先以鹽湯洗瘡拭乾用散傅瘡上唯多爲佳著藥訖以軟帛纏裹當日即汁斷瘡乾若患急痛即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處則洗使淨其痂乾處不須近每洗訖傅藥如初似急痛即塗酥五六日即覺瘡上痂漸剝起但依前洗傅藥十日即瘡漸漸揔剝痂落軟處或更生白膿泡即榛破傅藥自然揔差神驗無比刑部張侍郎親嬰此病卧經六十餘日困頓不復可言在京衆醫並經造問皆隨意處方了無効驗唯此法得効如神今故錄之以貽好事者出第五卷中救急療甲疽方

屋上馬齒菜　崑崙青木香　印成鹽

右三味各燒成灰並等分又取光明砂少許於諸藥中拌摠和下篩爲細散以傅瘡上乾即易之以差止當瘡未差以前不宜食雞猪魚肉腥臊酒蒜等差後仍須三十日愼之良出第九卷中

必効療甲疽赤肉生甲邊上裹甲者方

取瓜州礬石燒令沸定末傅之濕即刮却更著日數易即消散寶宜城綿去効亦主雜瘡有蟲有黃水若得吳白礬石亦佳若無雞矢礬亦好

又療甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者方

黃耆二兩　藺茹三兩

右二味切以苦酒浸一宿以猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以塗瘡上日三兩度其息肉即消散出第四卷中

近効療甲疽瘡神妙方

熏黃（堅好者細研如粉）　蛇皮（燒灰）

右二味等分更和研之右先以温甜清浸洗瘡令軟以尖刀子割去甲角入肉處裹乾取藥棗栗許大以傅瘡上用軟帛裹之半日許藥黑即易之一日許即永除其先痛者傅藥訖一口飯頃即直痛定差訖一二日勿著窄靴鞋若能斷酒及猪雞魚蒜麪等其効愈速其藥不過三四度易永差篇十四郎中有効

肉刺方二首

古今録驗療肉刺方

好薄刮之以新酒醋和羊腦傅之一宿洗去常以綿裹薦之良出第四十一卷中

近効療肉刺方

以黑木耳取貼之自消爛又不痛宜以湯浸先微刮去上者乃用之

手足皸裂方五首

深師療手足皸裂方

蜀椒四大合汗以水一升煮之十沸去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸塗羊猪髓腦尤妙范汪同出第二十九卷中

集驗療手足皸裂血出痛方

若涉水霜凍面及手足皸裂瘃陵玉切又作瘃手足中寒瘡也下同壞取麥窠濃煮汁及熱以浸洗之即差

又方

取葱葉蓍及籜煮以漬洗之范汪同

又療人脚無冬夏常坼裂名曰尸脚此因履踏洗尸水及惡物故也方

取雞屎一升以水二升煮數沸待小冷以漬脚半日不過三四度差深師千金范汪同出第九卷中

千金療手足皴裂血出疼痛方

猪脂著熱酒中以洗之即差深師集驗同云無酒用湯亦佳出第二十四卷中

手足逆臚及瘃壞方二首

范汪療手足指逆臚方

眞珠一分乾薑二分

右二味擣末以粉瘡指上日三千金深師同

深師療冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及始熱痛欲瘃者方

蜀椒二分芎藭二分白芷防風各一分薑一分作薑

右五味以水四升煎令濃以洗之出第二十九卷中

疣目方一十九首

肘後療疣目方

月晦日夜於厠前取故草二七莖莖別二七過粉疣目上訖呪曰今日月晦疣驚或明日朝乃弃勿反顧之

又方

取亡人枕若席物以二七拭之亡人近彌易去也並出第五卷中

集驗療去疣目方

七月七日以大豆一合拭疣目上三過訖使病疣者人種豆著南向屋東頭第二霤中豆生四葉以熱湯沃殺疣目便去矣千金肘後范汪同

又方

取松柏脂合和塗其上一宿即不知處千金同

又方

作艾炷著疣目上炙之三炷即除范汪千金同

又方

以石硫黃雞疣目上六七過除千金同

千金去疣目方

取月十五日月正中時望月以禿帚掃疣目上三十遍差止

又方

以猪揩痒處揩之令少血出即差神驗不可加也

又方

以苦酒漬石灰六七日取汁點疣上小作摩即落

又方

杏人燒令黑研如膏塗之令差止

又方

以牛涎數塗之自落並出第二十四卷中

靜嘉堂文庫所藏

崔氏疣目方

取月盡日平旦井花水月生一日煮作湯竈突共面南自洗呪曰日盡水月初湯竈突共千疣死百疣亡凡七度洗及呪甚良

又方

先布紙一張於牀上即以筆點疣一下還點紙一下無問多少皆一一點每點即呪曰紙亦爛疣亦散點一遍訖乃深埋點紙於屋溜下久當疣散

又方

以蜘蛛網絲繞纏之自落良

又方

盜取一酸酒醋以摩疣上呪曰疣疣不知耆一酸酒醋洗你頭急急如律令呪滿七遍久即自愈並出第四卷中

張文仲療手足忽生疣目方

葫蕫赤子授使壞疣目上亦令以塗之即去范汪同

又方

以鹽塗疣上令牛舐之不過三度出第五卷中

近効療疣子法

以黑塗之不過五度即差

又方

以屋溜下水塗疣上韋給事方

去黑子方二首

集驗去黑子及贅方

生薤汁蘆五升灰 生薑灰五升灰 石灰二升半

右三味合和令調蒸令氣溜取甑下湯一斗從上淋之盡湯取汁於鐵器中煎減半更開火煎以雞羽搖中即然斷藥成欲去黑子疣贅先小傷其上皮令裁破以藥點之此名三灰煎祕方不傳古今錄驗范汪同出第九卷中

靜嘉堂文庫所藏

救急去黑子方

夜以煖漿水洗面以布揩黑子令赤痛挑動黑子水研白硏檀取濃汁以塗黑子上旦又復以煖漿水洗面仍以鷹屎粉其上出第三卷中

疣贅疵黑子雜療方六首

深師灰煎療瘤贅瘢痕疵及癰疽惡肉等方

石灰一斗五升　濕桑灰四斗　柞櫟灰四斗

右三味合九斗五升以沸湯令泥泥調濕內甑中蒸之從平旦至日中還取釜中沸湯七斗合甑三淋之澄清內銅器中煎令至夜斟量餘五斗汁微火徐徐煎取一斗洗亂髮乾之如雞子大內藥中即消盡又取五色綵翦如韭葉大量五寸著藥中亦消盡又令不強藥成以白鬠子中貯之作藥時不得令婦人小兒雞犬臨見之灰煎亦療瘤驗其肉瘤石瘤藥傳之皆愈其血瘤瘤附左右胡脉及上下懸癰舌本諸險處皆不可令消消即血出不止殺人不可不詳之

又療疣贅方

取速讀子熟時壞破之以塗其上便落並出第二十九卷中

千金療皮中紫赤疵痣黯黑方

乾漆熬　雌黃　礬石各三兩熬　巴豆五十枚去皮心

炭皮一斤　雄黃五兩

右六味爲散以雞子白和塗故帛貼病上日二易之即除深師加莽草三兩餘同出第二十四卷中

又療疣贅疵痣方

雄黃　硫黃　眞珠　礬石熬

茼茹　巴豆去皮心　藜蘆各一兩

靜嘉堂文庫所藏

右七味爲散以漆和令如泥以塗貼病上頃成瘡及去面上黑子點之即去深師同出第二十四卷中

古今錄驗療黑子去疣等五灰煎方

石灰　蒴藿灰　桑灰　炭灰　藁灰　各一升

右五味以水漉蒸令氣匝仍取釜中湯淋取清汁五升許於銅器中東向竈煎之不得令雞犬小兒女人穢者見之膏成好凝強如細沙糖即堪用量以點封之出第五卷中

廣濟療疣贅赤黑疵癜癰瘡痘息肉強結瘤等神効灰煎方

炭灰三升湯拌令濕徹以熱湯漬令半日後則還以湯淋之稍稍點湯不得太速下即灰汁不驗候汁下得三二升即內一小鐺中煎令一兩沸即別取一大兩石灰風化者爲佳恐中濕者須熬令極熱內灰汁中和煎以杖箪攪之勿住手候如煎餅麪少許細細取成膏急瀉著一瓷器中攪令冷不然須臾乾燥不堪用常候此煎十分有一分堪久停但有傷損肉色須臾變赤黑色痛如火燒狀若灸瘢發燃即肉病四爲効候經二十餘日病自然脫落無瘢痕欲衝風冷遠行貼烏膏亦神効痂亦易落瘡未差間忌小豆薑外縱有瘢亦不凸出烏膏在二十四卷中

減瘢痕方一十七首

廣濟療人面瘢痕滅之方

取白雞以油脂和水煮小麥令熟純以飼雞三兩日大肥安雞著版上作籠籠之七日莫與雞食空飼清水七日取猪脂去脉膜切嗽飼如食糞皆凝白開收煖水取塗瘢上十度平復舊欲用塗以麤葛布

靜嘉堂文庫所藏

措微赤離離訖然後塗之男女俱用効也

又療人面及身瘡瘢不滅方

鷹白糞 爛腐骨 烏白鹹 各四分 麝香二分

右四味研令如粉以葛布措令赤微離離以脂和傅之日二度差止並出第五卷中

劉涓子六物滅瘢膏方

衣中白魚 雞屎白 鷹糞白 芍藥

白斂 白蜂 等分

右藥研如粉以乳汁和塗瘢上日三良出第五卷中

小品滅瘢方

雞矢白一兩 辛夷人四分 白附子二分 細辛二分

右四味酒浸一宿以羊脂六合微火煎三上三下去滓傷瘢以甘草湯洗訖塗之一方有桂心二分

又方

鷹屎白一兩研白蜜和塗瘢上日三並出第十卷中

千金翼凡面皰瘡瘢三十年以上并冷瘡薑瘢金瘡等方

斑猫三枚去足翅熬 巴豆三枚去心皮 蜜陀僧 胡粉三兩

鵝脂三兩 煎金鉦銚沙三兩 高良薑三兩去皮 海蛤三兩取中者

右八味爲粉用鵝脂和夜半塗之旦以甘草湯洗之差止出第五卷中

救急滅瘢方

猪脂三斤飼烏雞令三日使盡收取白矢內白並當歸各一兩煎白芷令黃去滓內鷹矢白二分攪令調塗之旦洗之千金同

又方

蒺藜子 山梔子人各一

靜嘉堂文庫所藏

右二味爲散醋漿和如泥臨卧時以塗之旦洗之千金同一方

又方

痕凸出秋冬小麥麨春夏大麥麨下篩令細以醋和封之良千金同

又方

夏以熱尨熨冬以凍凌熨之千金同

又方

鷹矢白一兩　白魚二七枚

右二味爲散蜜和塗之日三即差千金同

又方

鷹矢白十分　白殭蠶八分

右二味研如粉白蜜和傅之日三差愼五辛肥膩生冷物千金同

又方

臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布摩傷以

塗之日四五過千金同並出第三卷中

必効滅瘢方

禹餘粮　半夏

右二味等分末以雞子黃和之先以新布拭瘢上令赤塗之勿令見風二十日滅矣十年瘢無不愈平復如故救急范汪千金同

又療灸瘡及金瘡凡百瘡瘢能令高者平下者起方

雞屎白　鷹屎白各二合　辛夷人四分　白附子

杜若各三分　細辛二分

右六味下篩以赤蜜少少和先以布揩瘢微破塗之日三差後忌五辛小豆油膩及酢飲酒等若愼口味如大小淺深無不差並出第四卷中一本無杜若有桂心

古今録驗療面上瘢瘕之方

靜嘉堂文庫所藏

白殭蠶一兩　珊瑚各一兩　白芷一兩　雞矢白一兩
朱砂一研兩
右五味擣蜜和傅之尤良
又方
木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百日出暴乾擣末
以塗之一方用醋漿水浸百日出暴乾末服方寸匕
日再出第三卷中

外臺祕要方卷第二十九

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校勘

靜嘉堂文庫所藏

外臺祕要方卷第三十 惡疾大風癩瘡等二十三門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

惡疾大風方一十首
諸癩方九首
烏癩方一首
白癩方五首
十三種丁腫方一十二首
丁腫方二十首
犯丁腫重發方二首
惡腫一切毒瘡腫方一十七首
反花瘡及諸惡瘡腫方四首
魚臍瘡方一十首
丹毒方九首

靜嘉堂文庫所藏

赤丹方五首
白丹方一十二首
丹胗方四首
赤胗白胗方一十一首
肺風兪熱胗方二首
雜丹胗毒腫及諸色雜瘡方五首
瘑瘡方一十二首　瘑瘡久不差方五首
癬瘡方一十一首
乾濕癬方一十五首
疥癬惡瘡方五首
疥風痒方七首
惡疾大風方一十首

千金論曰惡疾大風有多種不同初得雖遍體無異而眉鬚已落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背皆有頑處重者手足十指已有墮落有患四體大寒而重裘不暖者有尋常患熱不能暫涼者有身體枯槁者有津汗常不止者有身體乾痒徹骨搔之白皮如麩卒不作瘡者有瘡痍茶毒重累而生晝夜痛不已者有直置頑鈍不知痛痒者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯闇此疾雖種種狀貌不同而難療易療皆屬在前人不由醫者何此病一著無問賢愚皆難與語口順心違不受醫教直希望藥力不欲求已故難療易療屬在前人不關醫藥且嘗手療六百餘人差者十分有一莫不一一親自撫養所以深細諳委知其情性且共語看覺難共語不受人教即不須與療縱與療終有觸藥力病既不差乃勞而無功也仁者易共語故可療也

又論曰神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道者何皆由割棄心

靜嘉堂文庫所藏

累懷潁陽之風所以非止差病乃至因禍而取福也故目所覩
病者其中頗有士大夫乃至有異種名人遇斯患皆戀愛妻
孥繫著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絶其
嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙嘗問諸病士人
皆云自作不仁之行久久並爲極猥之業於中仍欲更作云爲
雖有悔言而無悔意但能自新受師教命養進藥餌何有不除
臣以正觀中嘗將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生
由此觀之唯須求之於已不可一仰醫藥者也然有人數年患
身體頑痺著見妻子不告之令知其後病成狀候分明乃云卒
患此皆自誤然斯疾也雖大治之於微亦可即差此疾一得多
者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者皆自謂百年不死
深可悲悼

又論曰一遇斯疾即須斷鹽常進服松脂一切公私物務釋然皆
弃猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交俗事絶乎慶
吊幽隱巖谷周年乃差差後終身慎房室犯之還發茲疾有吉
凶二義脩善則吉若還同俗類必是凶矣今略述其由致以示
後之學者可覽而思焉

又苘豆療惡疾方

細粒烏豆擇取摩治之去有皮不落者三月四月取
天雄烏頭苗及根淨去土勿洗擣絞取汁漬豆一宿
豆如熟豆大漉出暴乾如此七度始堪服每服三枚
漸加至六七枚日一忌房室豬魚雞雉肉畢三十日
毛髮即生犯藥即不差

又岐伯神散療萬病癰疽疥癩風癢骨肉疽敗百節疼眉毛髮
落身體搖搖躍躍痛痒目痛爛眵作眥耳聾齲齒疼瘦等方

天雄炮去皮 附子炮去皮臍 細辛 烏頭炮去皮

茵芊 各一兩 乾薑 二兩 石南 昌蒲
防風 各二兩 白朮 獨活 各三兩 躑躅 一兩
椒 一兩汗 防葵 一兩 枳實 二兩炙

右十五味擣散以酒服方寸匕日三勿加忌猪肉冷水生菜桃李雀肉青魚鮓餳羊肉等 一方無防葵枳實

又療惡疾狼毒散方

狼毒 炙 秦艽

右二味等分爲散酒服方寸匕日二服五十日愈切須忌愼

又方

松脂鍊投冷水中二十遍杵末蜜丸服二兩飢即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及雜食房室

又石灰酒主生髮毛長鬚眉去大風方

松脂 成鍊者十斤 黍米一石 上麴一斗五兩 石灰一石水拌如餻二斤蒸令氣足

右四味先於大鐺中炒石灰以木札著灰中火出爲度絹把攪劉五斗以水一石五斗煮取九斗半去滓以淋石灰三遍澄清以石灰汁和釀漬麴用汁多少一如釀法訖封四七日開飲一二升常令酒氣相及爲度百無所忌不得觸風其飴米水及飯糟一事以上不得使六畜犬鼠食之皆須令深埋却此方九月作至二月止恐膈上熱者服後進三五口冷飯壓之婦人不能食飲黃瘦積年及褥風不過一石即差其松脂末初酘酒攤飯時均散著飯上待飯冷乃酘之此酒飯宜傷冷不爾即酢宜知之

又療風身體如蟲行方

鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍亦療一切風

又方

以淳灰汁洗面不過一月日愈

又方

以大豆漬飯漿中旦温洗面頭中瘥加少麥沐頭勿以水濯之十洗必差

又方

成鍊雄黄松脂等分蜜和丸以飲服十丸丸如桐子大日二百日差慎酒肉鹽豉生冷生血物等神祕不傳出第二十四卷中

近効婆羅門僧療大風疾并壓丹石熱毒熱風手脚不隨方

消石一大兩　生烏麻油二大升

右二味内鐺中以土擊蓋口以紙泥固際勿令氣出細細進火煎之其藥未熟氣腥候香氣發即熟更以生油麻油二大升和之更微火煎之以意斟量得所訖内不津器中服法患大風者用火炙使在室中重作小紙屋子屋子外然火令病人在紙屋中發汗日服一大合病人力壯日二服服之三七日頭面疱瘡皆滅若服諸藥丹石熱發不得食熱物著厚衣卧厚牀牀風者即兩人共服一劑服法同前不用火爲使忌風二七日若丹石發即不用此法但取一匙内口待消咽汁熱除忌如藥法呂貞外處得

諸癩方九首

病源凡癩病皆是惡風及犯觸忌害得之初覺皮膚不仁或淫淫苦痒如蟲行或目前見物如垂絲或隱脹赤黑此皆爲疾之始起便急療之斷米穀着鮭專食胡麻松木葷最善也夫病之生多從風起當時微發不將爲害初入皮膚之裏不能自覺或流通四肢潛於經脉或在五藏乍寒乍熱縱横脾腎蔽諸毛腠理壅塞難通因茲氣血精髓乖離失而不療令人頑痺或汗不流泄手足酸疼針灸不痛或在面目胃胃變變或在肩頸狀如蟲行或身體偏痒搔之生瘡或身面腫方徹骨髓或頑如錢大

靜嘉堂文庫所藏

狀如蛇毒或如梳或如手錐刺不痛或青黃赤黑猶如腐木之形或痛無常處流移非一或如酸棗或若懸鈴或似繩縛拘急難以俛仰手足不能搖動眼目流腫內外生瘡小便赤黃尿有餘瀝面無顏色恍惚多忘其間變狀多端毒蟲若食人肝眉睫墮落若食人肺鼻柱崩倒或鼻生息肉塞孔氣不得通若食人脾即語聲變散若食人腎耳鳴秋啾或如雷鼓之音若食人筋脉支節墮落若食人皮肉頑痺不覺痒痛或如針錐所刺名曰刺風若蟲乘風走於皮肉猶若外有蟲行復有食人皮肉徹外從於頭面即起爲皰肉如桃核小棗從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風令人多瘡猶如癬疥或如魚鱗或痒或痛黃水流出初起之時或如榆莢或如錢孔或青或白或黑或黃變易無定或起或滅此等皆病之兆又云風起之由皆是冷熱交通流於五藏徹入骨中虛風因濕和合蟲生便即作患論其所犯多

四用力過度飲食相違房室太過毛孔既開冷熱風入五藏積於寒熱寒熱之風交過通徹流行諸脉急者即患緩者稍遠所食穢雜肉蟲生日久冷熱至甚暴蟲遂多食人五藏骨髓及於皮肉筋節久久皆令壞散名曰癩風若其欲療先與雷丸等散服之出蟲見其蟲形青赤黑黃白等諸色之蟲與藥療者無不差然癩名不一大癩者初得先當落眉睫面目痒如復生瘡三年成大患急療之愈不療患成火癩者生瘡如火燒瘡或斷肢節七年落眉睫急療可愈八年成疾難可療金癩者是天所爲也負功德祟初得眉落二年食鼻鼻柱倒亘療良醫可能療愈土癩者作病身體塊磊如雞子彈丸許此病宜急療之六年成大患十五年不可療水癩者先得水病因即留停風觸發動落人眉牖急療之經年病成蟋蟀癩者如蟋蟀在人身體內百節頭皆欲血出三年亘療變癩者蟲出如麪舉體艾白難療熏藥可愈

多年亟療白癩者斑駁或白或赤眉鬚墮落亦可療之多年難
療疥癩者狀似癬瘙身體狂痒十年成大患可急療之愈風癩
者風從體入或手足刺痛風冷痺癡不療二十年後便成大患
急療之愈蚘癩者得之身體沈重狀似風癩可療之至久積歲
成大患疾速療之酒癩者酒醉卧黍穰上因汗體虛風從外入
落人眉鬚令人惶懼小療大愈養生禁忌云醉酒露卧不幸生
癩也又云魚無鱗不可食食之令人五月發癩出第二卷中
肘後凡癩病皆起於惡風及觸犯忌害得之初覺皮膚不仁淫
淫若痒如蟲行或眼前見物如垂絲或隱瘭赤黑氣瀋汎此皆爲
疾之始便急療之此疾乃有八九種診候知難易取病源大都
皆須斷米穀鮭肴專食胡麻松木最善別有蠻夷酒決疑丸諸
大方數首亦有符術今只取小小單方

苦參 乾者五斤銼之

右一味以好酒三斗漬四五日稍稍飲之二三合常將之備
急同本方療白癩

又方

苦參根皮三斤

右一味麤擣以酒三斗漬二十一日去滓服一合日三若是
癩疾即應覺痺禁雜食

范汪療癩方

取馬薪蒿一名馬矢蒿一名爛石草擣末服方寸匕
日三百日如更赤起一年都盡平復肘後同

又方

炙兩手約指中理左右及手足指虎口中隨年壯
深師療癩身體面目有瘡必死方
取白艾蒿十束如外大煞取汁釀米七斗一如釀法酒

靜嘉堂文庫所藏

熱稍稍飲之

又方

水銀 研 茼茹 藜蘆 真珠 研
丹砂 研 雄黃 研

右六味各一斤皆研如粉以三歲苦酒三石五斗於瓦中漬諸藥令耗七日於淨溫密室中漬浴始從足漸至膺浸之日一以綿拭面目訖以水洗兩目勿令入目也可七日爲之勿令冷神効忌猩肉生血等范汪同

又療通身癩瘡方

蓮荷二十枚石灰一斗淋取汁合煮令極濃以漬瘡半日許可數爲之

又方

取水中浮萍青者一秤濃煮以漬浴半日用此方多愈並出第九卷中

集驗療癩方

取葎草一擔以水二石煮取一石以漬洗瘡不過三五度差

烏癩方一首

病源夫癩病皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變異或淫淫若痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李隱癰赤黑手足頑痺針刺不覺痛腳下不得踏地凡食之時開口而鳴語亦如是身體瘡痛兩肘如繩縛此名黑癩出第二卷中

集驗烏癩白癩九方

猬皮 炙 魁蛤 蝮蛇頭 炙 木蚕 四枚去翅足熬
蚕蟲 去翅足熬 蜻蜻 各一枚並炙 陵鯉甲 去翅足炙 葛上亭長 七枚炙

班貓去翅足七枚炙 蜈蚣去頭足炙 附子炮去皮 蜘蛛五枚炙
水蛭一枚 雷丸三十枚 巴豆十五枚去皮心熬 水銀研
大黃 真丹 桂心 射罔各一兩
黃連一分 石膏研二兩 蜀椒汗三分 芒消一分研
龍骨三分 甘遂熬 礬石燒半日 滑石各一分

右二十八味擣篩蜜和丸如胡豆服二丸日三加之以知爲度忌猪肉冷水生葱此方分兩多不同爲是古方傳寫差錯若臨用時即以意量之范汪同出第八卷中一方有七蟲無木蠹斑猫蜈蚣蝮蛇作蝮蛇

白癩方五首

瀹源凡癩病語聲嘶破目視不明四肢頑痺肢節火然一作大熱心中煩熱手脚俱緩背脊至急肉如遭劈身體手足隱瘭起往往正白在肉裏鼻有息肉目生白珠當瞳子視無所見此名白癩出第二卷中

苦參二斤 露蜂房五兩炙

右二味切以水三斗法麴二斤和藥漬經三宿絞去滓炊黍米二斗釀準常法作酒候酒熟壓取先食一飲一雞子日三稍稍增之以差爲度肘後同出第八卷中一云亦療風瘡惡瘡

范汪療在身白屑虛搔之或呼作白癩方

苦參五斤 露蜂房五兩熬 猬皮一具炙對之 麴三斤

右四味切以水三斗五升合藥漬四宿去滓炊米二斗釀如常法酒熟食後飲三五合漸增之以知爲度

千金療白癩大風眉鬚落赤白癩病八風十二痺筋急肢節緩弱飛尸遁注水腫癰疽疥癬惡瘡脚攣手折眼闇血脉淡飲宿滯寒冷方

商陸根二十五斤如馬耳薄切之 麴二十五斤

右二味以水一斛漬之炊黍米一石釀之如家造酒法使麴米相淹三酘之訖封三七日開看麴浮酒熟澄清溫服之至三升稍輕者二升藥發吐下佳宜食粥飯牛羊鹿肉羹忌生冷酢滑猪肉魚雞犬肉等物出第二十四卷中

文仲療白癩方

乾艾葉濃煮以漬麴作酒如常法飲之令醺醺姚氏范注同

又方

大蝮蛇一枚乾者并頭尾完勿令欠少炙以酒漬之大者一斗小者五升以糠火溫令酒盡稍稍取蛇一寸許以臘月猪膏和傅瘡上忌小麥熱麪肘後范注同並出第五卷中

十三種丁腫方一十二首

千金論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興此之二氣更相擊怒當其時也必有暴氣夫暴氣者每月必有卒然大風大霧大寒大熱若不將避人忽遇之此皆入人四體頓折皮膚外變經脉遂使腠理擁閉榮衛結滯陰陽之氣不得宣瀉變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至於丁腫若不預識令人死不旋踵若著著訖乃欲求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡瘍無所逃矣

又一曰麻子丁其狀肉上起頭大如黍米色少烏四邊赤微多痒忌食麻子及衣麻布并入麻田中行二日石丁其皮肉相連色烏黑如烏豆甚硬刺之不入肉內蔭蔭微疼忌瓦礫塼石之屬三日雄丁其狀疱頭烏靨四畔仰瘡疱漿起色黃大如錢孔許忌房室四日雌丁其狀瘡頭少黃向裏靨赤似灸瘡四畔疱漿起色赤大如錢孔忌房室五曰火丁其狀如火瘡頭烏靨四

靜嘉堂文庫所藏

畔有皰漿漿如赤粟米忌灸爆食炙燔等物六曰爛丁其狀色少黑有白斑瘡中有膿水形大小如匙面忌熱食爛臭物七曰三十六丁其狀頭烏浮起形如烏豆四畔起大赤今日生一明日生二至三日乃至十若滿三十六藥所不療如未滿者可療俗名黑皰忌瞋喜愁恨八曰蛇眼丁其狀療頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼體大硬忌惡眼人見之及嫉妬人看之九曰鹽膚丁其狀如匙面遍瘡皆赤有黑粟起忌鹹食十曰水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑壓汁出中硬忌飲漿水洗渡河十一曰刀鐮丁其狀瘡闊狹如韭葉長一寸側內黑忌燒爆刺及刀鐮切割十二曰浮漚丁其狀如浮漚瘡體曲圓少許不合長狹如蓮葉大內黃外黑曲黑曲處刺不痛裏黃處刺痛十三曰牛拘丁其狀肉皰色掐不破

右十三種丁瘡初起必先痒後痛先寒後熱熱定多四肢沈重頭痛心驚眼花若大重者嘔逆嘔逆者難療其麻子丁一種始末唯痒所錄之忌不得犯觸犯觸者難療其浮漚牛拘兩種無禁忌縱不治亦不殺人其狀寒熱與諸丁同皆以此方療之萬不失一欲知犯觸但春強瘡痛極甚忍不可得則是犯之狀療之方用枸杞春名天精夏名枸杞秋名卻老冬名地骨春三月上建日採葉夏三月上建日採枝秋三月上建日採子冬三月上建日採根四味並暴乾若得五月五日午時合和大良如不得依法採者但得一種亦得緋繒一首以裹藥爲限亂髮一雞子大牛黃如梧子大反勾棘刺針二七枚末赤小豆七枚末先於緋繒上薄布亂髮以牛黃末等布髮上即卷緋繒作團亂髮作索十字繫之熬斗中急火熬令沸以沸定自然乾即刮取擣作末綿下之以方寸匕取枸杞根等四味合和擣篩二匕合三匕和令相得又分爲三

靜嘉堂文庫所藏

分旦空肚酒服一分日三
又凡是丁腫用之齊州榮姥方
白薑石十八兩黃軟者 牡蠣九兩爛者 枸杞白皮二兩
鍾乳下者研二兩 白石英一兩研 桔梗一兩半
右六味各擣篩乃秤之合和攪令相得先取伏龍肝九升末之
以清酒一斗二升攪令渾渾澄取清二升和藥捻作餅子大
六分厚二分其濁滓仍著盆中布餅子於籠上以一重紙藉
盆上以泥酒氣熏之仍數攪令氣發經半日藥餅微乾乃內
瓦坩瓶中一重紙一重藥遍布勿令相著密以泥封之三七
日乾以紙袋貯乾處舉之用之法一如後方前二家方本是
一家智者平論以爲後方最是眞本其病通忌酒肉五辛芸
薹胡荽油麪生冷酢滑耳後方如左崔氏同
白薑石二十五兩 牡蠣十兩 枸杞根白皮四兩 茯苓三兩

右四味細篩合和先取新枸杞根切六升以水一斗半煮取五
升去滓內狗屎二升攪令調勻澄取清和前藥熟擣捻作餅
子陰乾取兩刃針當頭直刺瘡痛徹拔出刮取藥末塞孔中
拔針出即內藥勿令歇氣并遍封瘡上頭即脹起針挑根出
重者半日以上即出或已消爛挑根不出自差勿憂之其病
在內者外當有腫相應並皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞
刮取藥如梧子五枚和服之日夜三四服外自消也若須根
出服藥後一日以上以雞羽剔吐出根縱不出根亦自消爛在
外者亦日夜三遍傳藥根出後常傳勿休生肉易差若犯者
取枸杞根切三升以水五升煮取三升去滓研藥一錢匕和枸杞
汁一盞服之日二三服并單飲冷枸杞汁一二盞彌佳又以枸
杞汁絞狗屎取汁服之最良合訖即用不必待乾依五月五
日七月七日臘日合者其用療病尤良但有人卒患喉中痛

靜嘉堂文庫所藏

乍寒乍熱者即是其病當急以此藥療之腹中無故而痛惡寒發熱者亦是此病前二方同是一方法用一同亦主癰瘕等病

又方　以針刺四邊及中心塗雄黃立愈

又方

馬齒莧一　石灰三分

右二味和搗以雞子白和塗之文仲備急等同出第二十三卷中

又療一切丁腫方

取蒼耳根莖子等燒作灰以酢泔淀和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔根出

又論曰昔以正觀四年忽口右角患丁腫造甘子搌其子搌每爲貼藥十日不差昔以此療之一如方說自是常作此方以救諸人未說有不愈者故特論之以傳後世丁腫方殆有千首皆不及齊州榮婞方亦不勝此物造次易得也

又方　飲鐵漿一椀即差

又方

蒺藜子一升作灰以醯酢和封頭破塗上一宿差

又方　皂莢子中人末傅之數貼五日愈

又論曰凡療丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血然傅藥藥氣入針孔中佳若不達瘡裏則不相得力也

又論曰其腫好著口邊頰中舌上者看之赤黑如珠子疼痛應心是寒毒久結變作此疾不即療日夜根長流入諸脉數道如蠶入身捉人不得動搖若不慎口味房室死不旋踵經五六日不差眼中火光生心神憒昧不可具論此其狀也並出第二十三卷中

備急療丁腫姥方云丁毒爲瘡肉中突起如魚眼狀赤黑疼痛是寒毒之結變作此疾始作服湯及如療丹法便差又支太醫

靜嘉堂文庫所藏

云有一十三種丁瘡其狀在大方中初起皆患寒熱又三十六丁亦是十三種數內或今日生一明日生二或生三或生十滿三十六丁皆療之方

蛇皮灸末和鼠矢以針刺破瘡內中即拔出差正文仲同

又方

取人糞乾者末之挑腫破傳瘡大良若犯瘡未死者開口灌廁清一大升須臾立差

又方

取白馬牙齒燒作灰先以針刺瘡令破以灰封之用麪周匝圍之候腫軟用好酢洗却灰其根即出當便差

又內令消神驗方

反勾棘針 三十二枚一作以上陳者 生大豆黃 四十枚全者

緋頭須 三條條闊一寸 亂髮 三雞子許

右四味作三分先將緋一片裹棘針豆黃各三七枚用髮一塊纏緋令周匝牢固又取兩段緋各如法裹之訖各於炭火上燒令煙盡且以兩段於瓷器中熟研之和酒半盞空腹服之半日瘡四邊軟內舒適即差半日不覺可更服一段必差若後犯之有三五豆赤黑膿出不經犯者十八日即差此方甚効勿犯之

丁腫方二十首

廣濟療丁腫毒氣傳藥差方

白馬牙 燒令赤內米醋中更燒依前十遍 附子 生用末

雄黃 研 半夏 末

右四味各等分少減以臘月猪脂和如泥封腫上一兩遍即差根爛其腫當頭先以針刺至痛處然可封藥即効

又方

靜嘉堂文庫所藏

爛棘刺三枚反勾者丁香七枚並燒令煙斷末以末滿
月孩子糞和塗腫上頻頻三兩度根爛差

又方

車轄軸脂　白鹽　燕菁根　釜底墨等分末

右四味等分爲末和以膩月猪脂傅上以醋及水和傅之普得

又療丁腫封藥後宜常服散方

亂髮燒圖一　反勾棘針爛者二升許　露蜂房一

蛇脫皮一升　絳緋關赤一

右五味分作五分以緋裹之用麻急纏之於炭火上燒如煙欲
斷即收勿令作白灰末以酒和空肚服方寸匕日二夜一差止
不利忌生麻子小豆蒜猪肉羊肉魚蒜油膩麪等

又方

半夏生用　石灰等分

右二味擣末以傅瘡上並出第五卷中

備急療丁腫方

乾薑　胡椒　龍骨　斑猫去翅足熬　皂莢炙去皮子

右五味各等分擣篩以酒和封瘡破安孔中日一傅之忌食
麪酒肉油膩等物

又方

以針刺破癰頭取熱人糞塗上乾易之不過十五遍
即出又以硇砂封上若毒入腹以枸杞根切煎服之
如犯觸亦然

又方

露蜂房二七枚　曲頭棘刺二七枚　蒼耳子一七枚　緋一寸

亂髮一雞子大　廣高草節二七枚

右六味熬令黑末研朱砂少許和酒服方寸匕日三服後加酒

靜嘉堂文庫所藏

令微有隋色禁食如常療內腫彌佳文仲同

又方

斑猫一枚捻破煞後以針畫瘡上作米字以封上即根乃出也

又方

生大豆黃三十枚拿者 緋頭須帛三條如無用五寸緋代 亂髮一雞子許

右三味以緋裹亂髮牢纏於炭火上燒得黑煙欲盡即出之冷瓷器中研如粉以酒空腹服之方寸匕平明至午時覺四體舒通覺瘡輕即差如未依前服之差止若犯之瘡即出膿血未經犯六七日平貼忌如常法

必効療丁瘡方

取舊廁清絞取汁青竹節燒作灰

右二味研和清攪一百遍稀稠成膏刺瘡四邊令遍先以唾和塗圍瘡四面寫藥漸漸令滿其中仍三五度換之晬時瘡即爛以針挑之拔去根即差止末出更著之神効

又方

蜂窠七枚露者 真緋手大 亂髮大拳

右三味各燒爲灰作末酒一小升和頓服之差止未差更作之並出第六卷中

古今錄驗療丁腫方出徐王

大黃 秦艽 藜蘆 石硫黃研 礜石研各一分

右五味擣篩爲散以刀子頭取和冷水量瘡大小封之若腫大悶可作五香湯服之并取麪和塗腫上乾即易之以消可休一方無大黃封之頻刺四面麪物紙貼勿令塗數著也

又方

白馬齒 亂髮 髑髏各一分 枹杞白皮三分

靜嘉堂文庫所藏

右四味燒作灰以酒和服方寸匕不差至二匕

又方

曲頭棘刺四百枚　橘皮三兩

右二味以水三升煮取半升服一合四合塗腫上

又方

取礪石擣爲粉醯酢和封之立拔根出

又方

五月五日取壯狗矢燒作灰傅瘡數易之

又方

巴豆二七枚去皮半夏二七枚擣末以寒食餳和之以針刺瘡四邊令微到底即以藥塗之立拔出以澤瀉末填瘡孔中便差侍郎崔世謨送忌羊肉餳等等物

又方

蛇脫皮四分燒灰　露蜂房灰一分

小兒十歲以上未塗油髮灰一分

右三味並用五月五日採燥之相和以新瓦椀內燒灰白飲服棗許大令汗出未汗更服以汗爲度即不經日云七日不得食鹽酒肉五辛房室生冷酢滑等一云出來不得食蝟肉雞肉食者難差蛇皮不得帶赤色有毒純白者上此高獺奴法邢長史傳之

又方高僕射送

亂髮急縛一雞子許大　緋帛方三寸　曲頭棘刺七七枚東枝白腐者

蒼耳三七枚

右四味合燒作灰研成散每以水半盞許服方寸匕日二三差止慎風熱餘忌同前慮有犯觸加鹿角一方寸鱉甲三方寸蜂房三寸三物等分燒灰爲散若有犯者依前方服之甚効並出第三十卷中

犯丁腫重發方二首

廣濟療丁腫犯之重發方

青羊糞一升

右一味以水二升漬少時煮兩沸絞取汁一升頓服無所忌出第五卷中

古今錄驗療犯丁腫方晉醫公上

枸杞白皮末一方寸匕 麥七粒燒灰 麻子七粒燒灰

緋帛一方寸燒灰 勾頭棘子二七枚大小如羊糞者熬令黃 半夏一七枚

亂髮灰半匕

右七味藥不問冬夏惡須溫酒和服多少任人性能進則令有酒色此方無所忌不宜犯麻子多致死得療者愈也出第三十卷中

惡腫一切毒瘡腫方一十七首

廣濟飛黃散療諸惡瘡腫方

曾青 雌黃 白礬石 礜石

雄黃 丹砂各一兩

右六味各細研依四方色以藥置色處曾青東方丹砂南方白礬石西方礜石北方雄黃中央瓦甕二枚以黃泥下一重三過使厚五六分以雌黃屑著下合篩諸藥著上後以半雌黃屑覆上以泥密塗際勿令氣泄上須厚一宿如常點火點火用二年陳蘆作燋中調火以新布沈水中覆盆上乾復易九十沸止若日暮七十七沸亦足止大熟一斛米飯頃發出藥惡肉青黑乾不復出汗愈無瘥以土盆二枚如上法也出第三十一卷中第二十四卷緩疽中有此方更有石英石膏鍾乳雲母凡十味

千金療惡毒腫或著陰卵或偏著一邊疼急癢痛牽少腹不可忍一宿殺人方

茴香苗葉

靜嘉堂文庫所藏

右一味擣取汁飲一升日三四服其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國神方從永嘉以來用之起死神効

又凡風勞毒腫疼攣痛或牽引少腹及腰膀痛方

桃人一升去尖皮兩人熬令黑煙出熟擣研如脂膏以酒三升攪令相和一服覆取汗不過三差甚妙

又大麻子小豆湯主毒腫無定處或嘗嘗惡寒或心腹刺痛煩悶者此由毒氣深重也方

射干三兩 商陸二兩薄切 赤小豆一升 麻子五升

附子三兩炮 升麻四兩

右六味切以水二斗煮麻子取一斗半去滓研麻子令破以麻子汁煮藥令豆極熟去滓可得六七升一服一升日夜令盡小便當利大下即毒腫氣當減食此豆益佳如湯沃雪也

出第二十三卷中

崔氏五香湯療毒腫方

麝香研 青木香 雞舌香 藿香

薰陸香 當歸 黃芩 升麻

芒消各三分 大黃五分

右十味切以水六升煮取二升去滓入芒消令烊分爲二服相去六七里久亦療諸卒尸注惡氣也

又療惡腫犀角湯方

薰陸香 青木香 雞舌香 藿香

犀角各二分屑 沈香二分 升麻七分

右七味切以水六升煮取二升半去滓分三服其間消息以意量之毒腫不然者腫殺人也出第五卷中

又烏膏療一切瘡引膿生肌殺瘡中蟲方

烏麻油一升生績者 黃丹二兩羅之 薰陸香一兩乳頭者

靜嘉堂文庫所藏

末松脂半兩 末臘半兩鎔滓以上並大升大兩

右五味先空煎油三分減一停待冷次內黃丹更上火緩煎又三分減一又停冷次內薰陸香末不冷即恐溢沸出煎候香消盡次下松脂及臘看膏稍稠即以黐鐵物上試之斟酌硬軟適中乃罷先問所患瘡是熱即減薰陸及松脂若瘡如久不差此涉於冷依方煎之其貼杖瘡者油若一升地黃汁半合黃丹二大兩臘一小兩餘準上法此膏不須硬出第二卷中

必効療惡瘡方

熱毒腫以炙近下鑽孔盛水令水射腫又以雞子清封腫上熱即易之

又方

取芜蔚臭草擣汁服一雞子許滓封腫熱則易之

甚良

又方 擣地松汁服之每日兩三服即差止

又方

大黃 石灰 赤小豆各等分

右三味擣末以苦酢和塗之効出第四卷中

經心錄療諸毒腫升麻膏方

升麻三兩 白斂 漏蘆 連翹

芒消各二兩 黃芩 蛇銜各三兩 葫蘿根四兩

山梔子二十枚 枳實二兩

右十味擣碎以酒浸半日以猪膏五升煎之氣竭膏成去滓以器盛有毒熱腫取塗貼上摩之即消散日三小品同

又大瘡潰腫毒升麻湯方

升麻一兩 黃芩三兩 梔子二十枚 漏蘆二兩

靜嘉堂文庫所藏

萠藿根五兩 芒消二兩

右六味切以水一斗煮取七升候冷分用漬漬腫常令濕潤即消小品集驗同

又漏蘆湯方

漏蘆無用旋子 白斂 黃芩 麻黃

白薇無用知母 枳實炙 升麻無用犀角 芍藥

甘草炙各二兩 大黃三兩無用芒消

右十味切以水一斗煮取三升分三服若無藥處單服大黃一兩取利忌海藻菘菜等並出第五卷中千金云療一切癰小品亦治丹毒

近効療一切熱毒腫驗方并主乳癰

青木香 紫葛 紫檀 朴消各二兩

赤小豆一合 蜀升麻 白斂 生礬石各一兩

右八味擣篩以水和如稀麪糊又以榆皮汁和之亦佳以布剪可腫大小仍每片剪三兩箇小孔子塗藥貼腫上乾即易之至度支處

又貼毒熱腫消方

蔓菁根三大兩 芸薹苗葉根三大兩

右二味擣以雞子清和貼之乾即易之當日消

又方

商陸根 芸薹苗葉根等分

右二味擣之依上方貼之効

又療一切熱瘡腫消石膏方

消石一斤 生麻油三升

右二味先煎油令黑臭下消石緩火煎令如稠餳膏成以好瓷器中收貯以塗貼瘡腫或熱發服少許妙用好酥煎更良忌生血物

靜嘉堂文庫所藏

反花瘡及諸惡瘡腫方四首

病源反花瘡者由風毒相搏所爲初生如飯粒其頭破則血出便生惡肉漸大有根濃汁出肉反散如花狀因名反花瘡凡諸惡瘡久不差者亦惡肉反出如反花形也出第三十五卷中

千金療一切久不差諸惡瘡兼反花瘡大神驗方

鼠粘子草根細切熟擣和以臘月猪脂封貼腫瘡上取差止出第二十三卷中

必効療反花瘡方

柳枝葉以水煎成膏如稠餳塗之良

又方

取馬齒草燒灰傅之頻貼差止千金同

又方

鹽灰傅之神驗並出第四卷中

魚膾瘡方一十首

千金療魚膾瘡似新火針瘡四邊赤中央如欲黑色可針刺之若不痛即可畏也方 膾名魚

臘月魚頭灰以亂髮灰等分以雞稀漉屎和令相得封瘡上頻貼差止此瘡見不足言而能殺人

又方

以寒食餳封之又硬者燒灰塗貼傅之即差

又療魚膾瘡其頭白似腫痛不可忍者方

先以針刺瘡上及四畔作孔擣白芷取汁滴著瘡孔中如無以乾白芷末用傅 一云白芨

又方 本方云瘡赤根下瘡

取鼢鼠壤土以水和如泥塗貼上熱則易之差

又方

馬牙齒擣末以臘月猪脂和塗之拔根出即止亦燒灰用

靜嘉堂文庫所藏

又方 本方去療犯下癤
刺癤頭及四畔令汁極出生栗黃傅上以麪圍之勿令黃出自旦至午根必出

又方 同上
以麪圍癤如前法以針亂刺癤上及四畔取銅器煎醋令沸寫著麪圍中令容一盞冷即易之不過三度即拔根出

又方 肉
以水四升煮蛇脫皮如雞子大三四沸去滓服之立愈又燒蛇皮灰以雞子清和塗上差並出第二十三卷中

崔氏療魚臍毒癤腫方
癤初生之時頭白如黍米許大當中黑如蟻四畔赤至四五日之後疼痛不可忍似潰不潰雖至潰破膿出迴轉還滿疼痛不止者便是其候取獺屎以水和封腫處及癤上即得膿出止痛消腫慎口味與患丁腫同必至差莫浪雜犯觸千金同

又方
取瞿麥和生油熟擣塗之亦佳並出第五卷中

丹毒方九首
肘後天丹者惡毒之氣五色無常不即療之痛不可堪又待壞則去膿血數升或發於節解多斷人四肢蓋疽之類療之方
煮栗殼有刺者洗之姚同

又療發足踝方
擣蒜如泥以厚塗乾即易之集驗文仲備急同出第二卷中

小品說丹毒一名天火也肉中忽有赤如丹塗之色大者如手

靜嘉堂文庫所藏

掌其劇者竟身體亦有痛痒微腫方

赤小豆末二兩

右一味末下篩以雞子白和如泥塗之乾復塗之逐手消也竟身者倍合之盡復作刪繁千金同

又療丹諸單行方或得一物差

水苔　生蛇銜　生地黃　生松葉

蒴藋葉　五葉藤　慎火草　浮萍草

豆豉水和　大黃水和　梔子水和　黃芩水和

芒消水和

右十三味但得一物擣以貼之即差赤小豆末和雞子白塗之無雞子水和用之千金同

又方

新附淋草半斤　蛇退皮一條　露蜂房三兩

右三味以水一斗煮取四升以帛搦洗之隨手消神妙經用勿故附此卷傳之

又方　煮粟取濃汁以洗之妙

又方　取曲蟮糞水和如泥塗之

千金論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗大者如手掌甚者竟身痒微腫又白丹肉中起痒痛微虛腫如吹隱瘾起亦有雞冠丹赤起大者如錢小者如麻豆粒如雞冠上澀一名茱萸火丹有水丹由體熱遇水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在中喜著腹及陰處此雖小疾不治令人至死療之皆用升麻膏方

升麻　白薇　漏蘆　連翹

芒消各二兩　黃芩　蛇銜　枳實三枚各

梔子二十枚　蒴藋四兩

靜嘉堂文庫所藏

右十味擣碎令細細然以水三升漬半日猪脂五升煎之候水氣竭去滓乾器中收之量取傅丹毒上頻塗傅之以差止丹及熱瘡腫皆用之効忌如常內宜服黃蘆湯文仲備急無白薇集驗亦然崔氏同

又療丹神驗方

芸薹菜莫擣令熟厚封之隨手即消散餘熱氣未盡三日以來封使醒醒好止乾則封之勿歇以絕本良以正觀七年三月八日於內江縣飲多至夜睡中覺四體骨肉並疼比至曉頭痛目眩額左角如彈子大腫痛不可得近至午時近右角至夕諸處皆到眼遂閉合不得開幾至殞斃其縣令周公以種種方藥治皆不差經七日自處此方其驗如神故錄記之以傳來世云爾

赤丹方五首

病源赤丹者初發胗起大者如連錢小者如麻豆肉上粟如雞冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹出第三十一卷中肘後療面目身體卒得赤斑或黑斑如瘡狀或痒搔了腫起不即療之日甚殺人方

羚羊角煎以摩之數百遍若無羊角用牛脂及猪脂有毒藥者皆可用摩務令勻散毒氣神妙

又若已遍身赤者方

生魚合皮鱗燒擣末以雞子白和以遍塗之文仲備急同

又新附方

羚羊角無多少即燒之爲灰令極細以雞子清和塗之極神効無雞子以水和塗之亦妙出第二卷中一云豆一升半角燒之三兩爲末雞子白和傳之雞羊角屑用赤小豆良備急文仲同

集驗療人面目身體卒亦黑丹起如齊狀不療日劇遍身即殺人方

靜嘉堂文庫所藏

煎羊脂以摩之青羊脂最良千金文仲肘後刪繁同

又方

以猪槽下土泥塗之千金同又以飼猪豬灸瘡上即差

並出第八卷中

白丹方一十二首

病源白丹者初發痒痛微虛腫如吹胷起不痛不赤而白色由挾風冷故然色白也出第三十一卷中

肘後療白丹方

末敗以酒和塗之擣香薷葉若蓼傅之

又方

屋上塵以苦酒和塗之

又方

燒鹿角作灰以猪膏傅之

又方

蜜和乾薑末傅之

又方

酸摸草五葉草煮飲汁又以滓薄丹以薺亦佳備急文仲同出第二卷中

集驗云有白丹者肉中起痒痛微虛腫如吹癰瘺起者療之亦如赤丹法有雞冠者赤色丹起大者如連錢小者如麻麥豆粒也肉上粟粟如雞冠肌理也方說一名焉茱萸火丹療之如天火法有水丹由體熱過水濕搏之結丹晁晁黃赤色如有水在其中喜著腹及陰處療之亦如火丹法其水丹著人足跌及踹脛間者作黃色如火丹狀經久變紫色不療皆成骨瘡也無毒非殺人疾若成骨瘡即難差也經言風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒氣搏皮膚外發腠理開毫毛逕涇氣妄行之則為痒也所以有風瘾風瘡疾皆由於此有赤胷者忽起如蚊蚤吮煩痒劇者連連重沓龍腫起橙之逐手起有白胷者亦如此證也療之皆如療丹法也療之方

擣白瓷器屑猪膏和塗之

又方

燒猪矢灰和雞子白塗之肘後千金備急文仲同

崔氏療丹毒或發背及諸腫方

取馬齒草熟擣傅之數數易勿住若得藍淀和之更良

又方

以生羊牛肉貼數數易之良

又方

鼠粘草根勿使見風及火見洗去土熟擣以傅腫處兼

絞取汁飲之佳

又方

莞蔚草蛇銜草慎火草相和熟擣傅之良數數易之

又方

擣鯽魚傅之數數易之良出第五卷中 本方云起鯽魚傅之

備急療白丹方

苧根三斤小豆四升水二斗煮以浴日三四遍肘後文

仲同出第四卷中

丹胎方四首

病源丹胎者肉色不變又不熱但起癮瘾相連而微痒故謂之

丹胎出第三十一卷中

千金翼療丹癮瘕方

酪和鹽熱煮以摩之手下消也

又方

白苮根葉煮汁洗之効

又方

擣慎火葉封之神良

又方

以一條艾蒿燭竿以兩手極意尋之著壁伸十指當

中指頭以大艾炷灸燭竿上令燭竿斷即止灸十十

靜嘉堂文庫所藏

差於後重發更依此灸永差

赤脽白脽方一十一首

千金云凡赤脽熱時發冷即止白脽天陰冷即發方

白脽以水煮白鬱汁拭之又煮蘡薁著少酒以浴又

以酒煮石南拭之又以水煮雞屎汁拭之又枳實汁

拭之所療一如療丹法集驗同

又方

末白术酒服方寸匕日三盡五斤息桃李蒜青魚鮓雀肉

又方　淋石灰汁漬洗之

又方　煎白芷根葉作湯洗之

又方　芥子末以酢漿水服方寸匕日三服差

又療身體赤癮癗而痒搔之隨手腫方

莽草二分　當歸　芎藭　躑躅花

大戟　細辛　芫花

附子炮　椒各四分　猪脂二升半

右十一味切以猪膏合煎之候附子色黃膏成濾去滓收貯

以傅病日三以差爲度

又方　礬石二兩酒三升漬令爛拭上立差

延年療赤白二脽丸方

白朮一斤　蔓荊子四分　防風四分　附子炮二分

桂心二分

右五味擣篩蜜和爲丸如梧子大酒服十丸日二服稍加至十

五丸若能作散服一錢匕禁食桃李雀肉青魚鮓猪肉冷水

生葱此療風癗正方凡風皆由舊來有風氣所以方中不得不

用桂心附子白朮既用一斤附子只有二分復有防風其防風

即能斷附子毒所以一物毒亦無所至伏聽進止

靜嘉堂文庫所藏

又其赤胷心家稍虛熱氣相搏其色赤宜作芒消湯拭之方

芒消三兩

右一味用湯一升內芒消令消散以帛子沾取拭胷即漸除湯盡更合以前二件赤白赤方許崇處並出第十三卷中

古今錄驗云赤胷者由冷漸折於肌中甚即爲熱熱成赤胷也得天熱則劇取冷則減療之方

取生蛇銜草擣極爛以塗之最驗集驗小品同

又白胷者由風氣折於肌中之熱熱與風相搏遂爲白胷也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣身暖亦差療之方

水煮楸實拭之佳集驗同又擣末熬之青布裹熨之

出第三十卷中

肺風冷熱胷方二首

延年論曰凡風胷有二先受風寒氣其胷色白厚搔之即破應手下有道住此是肺家風冷氣宜外洗拭即定方

吳茱萸一兩清酒一升煮取五合以軟帛取汁拭胷處不過三兩度即定如胷處多用盡更合白胷即是肺藏受寒冷氣所發也

又療肺風熱皮膚生風結狀如胷或生風搔如水疥粟粒戢戢然方

天門冬八分去心 枳實十二分炙 白朮一六八分

人參各六分 獨活 苦參各五分有冷不用

右六味擣篩蜜和爲丸梧子大食後以飲下七丸日再服加至十丸忌鯉魚桃李蒜雀肉青魚鮓出第十三卷中

雜丹胷毒腫及諸色雜瘡方五首

刪繁療丹走皮中淫淫名火丹方

取蠐螬末水和傅之出第九卷中

靜嘉堂文庫所藏

千金療赤流腫方

榆根白皮擣末以雞子白和塗之出第二十三卷中

近効梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癤大小便不利方

芒消四分　大黃四分　梔子　甘草炙

黃芩　知母各六分

右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服忌如常法此方甚佳一方芒消三兩大黃四兩梔子二七枚黃芩知母各三兩甘草二兩右以水五升煮減半下大黃煮取一升八合去滓內芒消分三服

又療諸色瘡腫神驗方考功韋郎中處

胡粉熬令赤　小豆熬　糯米　吳茱萸

黃連各一小兩　水銀一分

右六味擣篩以生麻油和如稀麪糊然後取水銀於手掌中以唾指研熟訖入藥中令勻先椒湯洗瘡乾拭以藥塗之

日再以差爲度療孩子瘡佳一云用甜清洗瘡

又牛蒡粥療瘡腫方

取牛蒡根二莖淨洗煮令爛於盆中研令細去筋脉汁中即下米煮粥鹹淡任性服一椀甚良無忌

瘡瘡方一十二首

病源瘡瘡者由膚腠虛風濕之氣折於血氣結聚所生多著手足間遞相對如新生茱萸子痛痒抓搔成瘡黃汁出侵淫生長拆裂時差時劇變化生蟲故名瘡瘡出第三十五卷中

傑師療瘡瘡方

荊木燒取汁塗之差救急驗

又方

灸瘡上周匝最良並出第二十九卷中

集驗療瘡瘡方

苦酒一升溫令沸以生韭一把內中以薄瘡上即差

靜嘉堂文庫所藏

范汪同

又方

雄黃一兩　黃芩二兩作屑　松脂二兩　髮灰如彈丸大

右四味以白膏與松脂合擣以傳瘡上范汪文仲備急用黃連餘同

又方

亂髮頭垢分等螺殼二十枚燒以臘月猪脂和如溜泥以傳之范汪同

又方

羊躑躅花三升以水漬之半月去滓以汁洗瘡一方炙雞以傳瘡上蟲當出也范汪同

又方

桃花鹽等分合熟擣以酢和傳之范汪同

又方

皂莢十枚苦酒四升煮之去滓煎如飴以傳瘡上范汪同

又方

新瓦一口安雞屎黙酒下著火煎之成膏塗之

又方

穀木白汁一合　苦酒二合　小蒜半合　釜月下土一合

右四味和如泥以上塗密裹之乾復塗之並出第八卷中范汪同

刪繁療瘕瘡螺殼膏方

螺殼二七枚燔者　亂髮燒灰　頭垢　龍膽末

右四味各等分合研如粉以三年油淀和傳之加臘粉妙

又療瘕瘡多汁方

水銀八分以唾手掌中研令入藥用　黃連八分　胡粉八分熬令黃

右三味黃連爲末和以粉傳瘡上並出第二十九卷中

靜嘉堂文庫所藏

瘡瘡久不差方五首

病源瘡瘡積久不差者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間則生長常痒痛故經久不差出第三十五卷中

廣濟療瘡瘡久不差方

豆豉熬令極乾為末先以泔清洗瘡拭乾以生麻油和之塗傳上差以油單片裹之三日開未差更塗差止

又療諸瘡瘡經年衣手拂痕痒引日生不差瘡久則有蟲藥蘆膏方

藥蘆六分　黃連八分　礬石燒盡熬汁　松脂

雄黃研各八分　苦參六分

右六味擣以厚絹下之用豬脂二升煎之候膏成去滓入雄黃礬石末攪令和調待凝以傅之諸瘡經年或搔之汁出不生痂百藥療不差悉主之瘡痂痒頭瘡亦効熱瘡者起瘡便生白膿是也黃爛瘡者起瘡淺但出黃汁若肥瘡是也侵淫瘡者淺瘡黃汁出兼搔之漫延長不止是也瘡瘡者喜著手足相對痛痒坼裂春夏隨差集驗同

又方

劉羊桃枝葉

右一味水煮以洗之三四度

劉消子療久瘡疥癬諸惡瘡毒五黃膏方

雄黃二兩研　亂髮如雞子大燒　黃連一兩　黃蘗二兩

黃芩二兩　青木香二兩　雞舌香一兩　白芷二兩

狼跋子四十枚　雌黃二兩研

右十味㕮咀以苦酒半升漬諸藥一宿以臘月猪膏三升煎取髮三四沸內諸藥又三沸止絞去滓膏成傅瘡日五過出

第五卷中

靜嘉堂文庫所藏

崔氏療瘡積年不差瘡汁浸四畔好肉復變成瘡瘡色赤黑痒不可耐搔之血汁出者方

黃連　黃蘗　鼓心　各三分擣爲末一方加蔓菁子末有加杏人者與黃連等分擣篩之　胡粉　水銀　油脂　以上三物和之如泥

右六物若慮水銀不散可內掌中細細和唾研之自當散訖然後攪胡粉等以塗瘡上仍取黃連末粉之此瘡多有黃汁著藥候汁徹即易之以差爲度出第五卷中

癬瘡方一十一首

病源癬病之狀皮肉癮脂如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭裏生蟲搔之有汁此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏則血氣否澀發此疾按九蟲論云蝕蟲在人腸內變化多端發動亦能爲癬而癬內實有蟲也養生方云夏勿露面卧露下墮面皮厚及喜成癬出第三十五卷中

肘後療癬瘡方

獨活根去土乃擣之一把許附子二枚炮擣以好酒和塗之三日乃發欲傳藥先以皁莢湯洗拭令乾然後傳藥便愈出上卷中

深師療癬秘方

雄黃一兩研　硫黃一兩研　羊蹄根一兩　白糖一兩　荷葉一兩

右五味別後三種擣如泥合五種更擣和調以傳之若強以少蜜解之令濡不過三差

又療癬神驗方

用雄黃研以淳苦酒先和以新布拭癬上令傷以藥塗之神効不傳

又方

昌蒲細切取五升以水五斗煮取二斗以釀二斗米如酒法熟極飲令得極醉即愈未差更作無有不愈一云長服昌蒲末酒調并作丸佳

又方

取乾蟾蜍燒灰末以豬脂和塗之良出第二十卷中

千金翼療癬秘方

擣羊蹄根分著瓷中以白蜜和之刮瘡四邊令傷先以蜜和者傅之如炊一石米久拭去更以三年大醋和之以傅癬上燥便差若刮瘡處不傷即不差深師同出第二十三卷中

救急療癬方

先以針鍼癬上即擣瓜蒂末傅上仍先以泔洗之

又方

烊松脂擣熏黃末和更煎仍以泔清洗癬乃熱傅之一兩度即差並出第五卷中

必効療癬方

淳甲煎塗之愈好口脂亦得

又方

附子一枚炮　大皂莢一枚炙　九月九日黃葉四合

右三味爲散措癬上令汁出傅之乾癬苦酒和塗之深師古今録驗同並出第四卷中

古今録驗療癬方

作麻浮傅癬上裹之差麻浮不差以鹽及鼓和擣塗之即差止

乾濕癬方一十五首

病源乾癬但有匡郭皮粗索差搔之白屑出是也皆是風濕邪

靜嘉堂文庫所藏

氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若其風毒氣多濕氣
少故風沈入深故無汁爲乾癬其中生蟲
又濕癬者亦有匡郭如蟲行侵淫亦濕痒搔之多汁成瘡是其
風毒氣淺濕多風少故爲濕癬也其中亦有蟲出第三十五卷中
肘後療燥癬方
水銀和胡粉研令調以塗之范汪同
又方 以雄雞冠血塗之范汪同
又方
胡粉熬令黃赤色苦酒和塗之乾即易差止
又方 以穀汁塗之
又方 擣桃白皮苦酒和傅之隹千金同
又療濕癬方
刮猪令坼火炙揩摩之以蛇床子末和猪脂傅之差止

深師療乾濕癬神方
取狼毒末以苦酒研之如墨法先洗刮令傷以傅之差
不用大塗壞人肉范汪同
又烏梅煎治燥濕癬方
烏梅十四枚 大蒜十四枚 屋塵三合 鹽三合
大麻子四合
右五味相和熟擣以醯苦酒一升半拌和以傅之日三過差
又香澤療燥濕癬及瘑疥百瘡方
柏節 杉節 沈香節 松節 各一斤
右四味悉碎一如指大以布囊盛之音令囊注麻腰中半
食頃出澤先取一枚白坩穿去底令孔如雞鴨大以松葉
一小把藉孔上以坩安著白鹽以黃土泥塹坩合際令厚
數分畢以藥內坩中以生炭著藥上使然其澤當流入塹中

靜嘉堂文庫所藏

須然盡乃開出取堰中汁以薄瘡上日再用之療白禿疽疥惡瘡神効出第二十九卷中

崔氏療乾濕癬方

取楮葉面著癬用匙背打葉葉碎即換可三四度換即差亦可只用一葉唯熟打使極碎即裹之勿令碎葉落即差

又療乾癬積年痂厚搔之黃水出每逢陰雨即痒方

取巴豆肥者一枚炭火上燒之令脂出即於斧上以指研之如杏藝法以塗癬上薄傅之不過一兩度便愈

又療乾癬諸治不差者方

但看癬頭有非瘡子處即以小艾炷灸之差出第五卷中

古今録驗療濕癬方

石硫黃研大醋三年者和數數傅瘡上

又方

蛇床子一兩　黃蘗一兩　黃連一兩　胡粉一兩研

右四味擣篩為散內水銀一棗大和豬膏研入相和以塗瘡

劉公患脚膝已不可著之旬日間差云是驗方

又方

取肥豬肉薄割之於鐵上若熨底炙之令熱使人體堪之以傅瘡上日三四度出第四十卷中

疥癬惡瘡方五首

廣濟療疥癬惡瘡方

石硫黃六兩白礬十二兩熬並於瓷器中研以烏麻油和稠調如煎餅麪更熟研傅之熱炙疥癬上摩一二百下乾即移摩之取差出第五卷中

劉涓子療疥癬惡瘡膏方

靜嘉堂文庫所藏

丹砂 研 雄黃 研 亂髮 白蜜
松脂 別入各一兩 茼茹 三兩 巴豆 十四枚去皮 猪膏 升二

右八味先煎猪膏亂髮消盡內松脂蜜三上三下絞去滓末茼茹石蕊內膏中更一沸以攪令極調以傳瘡上日三著止
神効出第五卷中

救急療癬瘡方

白礬石 燒 多年韭根 雄黃 研 藜蘆
瓜蒂 胡粉 各一分 水銀 三分

右七味以柳木杵研水銀使盡用猪脂一升煮藜蘆韭根瓜蒂三沸去滓入石藥等攪令相得以傳瘡上甚妙

近効療熱瘡疥癬痒痛不可忍者方

消石止一物先用泔清洗瘡去痂拭乾看瘡大小研消石末和生麻油如麪糊以塗瘡上三兩度著

又方

水銀 燕粟 酥和塗之 薑黃塗之 牛李子塗之
醋煎艾塗之 羊蹄根和乳汁塗之出第三卷中
疥風痒方七首

肘後療疥方

石灰二升以湯五升浸取汁先用白湯洗瘡拭乾乃以此汁洗之有効出第六卷中

深師療疥大黃膏方

黃連 十四銖 藜蘆 十二銖 大黃 一兩 乾薑 十四銖
茼茹 十銖 莽草 十一銖 羊躑躅 十銖

右七味擣篩以成煎猪脂二斤微火向東煎之三上三下膏成去滓汁盡付之神効合時勿令婦人雞犬見之出第二十九卷中

集驗療疥方

靜嘉堂文庫所藏

擣羊蹄根和猪脂塗上或著少鹽佳范汪同

又療疥及風瘡瘡苦痒方

丹參四兩　苦參四兩　蛇床子一外

右三味切以水六升煎之以洗疥瘡以粉粉身日再爲之即差

備急葛氏療疥瘡方

取楝根削去上皮切皂莢去皮子分等熟擣下篩脂膏和搥疥去痂以塗之護風勿使女人小兒雞犬見之范汪同

又療方

石硫黃無多少研粉以麻油或以苦酒和塗摩之以酒漬苦參飲之並出第五卷中

薰疥法

取艾如雞子大先以布裹亂髮於紙上置艾熏黃末朱砂末杏人末水銀各如杏人許水銀於掌中以唾研塗紙上以卷藥末炙乾燒以熏之一云筒左一口一用棗灰蓋上以纏束之用熏疥於胸頭被內置之少時火盡上牀日一熏不過再即差雜所忌

外臺秘要卷第三十

奉議郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙孟孟校勘

靜嘉堂文庫所藏